

Size : 273 x 267 mm

## ग्रास एक्स

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी.  
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी. खरपतवार उगने के बाद इस्तेमाल होनेवाला एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जो गेहूँ की फसल में आनेवाले घास जाति के खरपतवारों जैसे गुल्ली डंडा या मँडूसी और जंगली जई के नियंत्रण के लिए सिफारिश किया गया है। इसमें ५.१% पिनोक्सॉडेन सक्रिय तत्व के रूप में मौजूद है और यह एक लिटर पदार्थ में ५० ग्रा. के बराबर होता है।

<b>रासायनिक संरचना :</b>	<b>मात्रा (भार/भार)</b>
पिनोक्सॉडेन स.त.	५.१०%
<b>सेफनर :</b> क्लोक्विनटोसेट मेक्सॉईल	१.२६%
<b>इमलसिफायर तत्व:</b>	
काॅस्टर आइल इथोक्सिलेट – ३०	५.०५%
डोजिसाईल बेनझीन सलफोनेट का कैलशियम लवण	२.०२%
<b>थिकनर:</b> पालीस्टाईरिन	०.५१%
<b>सहायक :</b> ट्रिस (२-इथाईल हेक्सॉईल) फॉस्फेट	३४.३०%
<b>साल्वेन्ट :</b> (टेट्राहाईड्रो – फूरान – २ – आईल) – मिथनोल	१८.२०%
सोल्वेन्सो २०० एनडी	पर्याप्त मात्रा
<b>कुल</b>	<b>१००.००%</b>

**इस्तेमाल का तरीका और सिफारिश:** नीचे दिये गये सिफारिशों के अनुसार पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी. का इस्तेमाल गेहूँ में बीज रोपण के बाद आने वाले घास जाति के खरपतवार जैसे गुल्ली डंडा या मँडूसी और जंगली जई के नियंत्रण करता है।

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर			अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि. ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
गेहूँ	गुल्ली डंडा या मँडूसी जंगली जई	४० – ४५	८०० – ९००	२२५ – ३००	९०

**इस्तेमाल के लिए सिफारिश :** खरपतवारनाशक का इस्तेमाल बीज रोपण के ३० – ३५ दिन के बाद, जब ज्यादातर खरपतवार उग आये हों या जब गुल्ली डंडा और जंगली जई ३ – ५ पत्ते की अवस्था में हो, तब इसे सिफारिश की गयी मात्रा में प्रयोग करें।

**सोखने का तरीका :** पिनोक्सॉडेन तेजी से खरपतवार की पतियों द्वारा सोख लिया जाता है और इसे पतियों और तनों के बढ़ते हुए बिंदुओं तक पहुँचा दिया जाता है। कोमल खरपतवार प्रजातियाँ सामान्यतः उपचार के ४८ घंटों के भीतर बढ़ना बंद कर देती हैं, एक से तीन सप्ताह में पीली हो जाती हैं और तीन से पांच सप्ताह में इन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है।

**प्रयोग के लिए निर्देश:** इस खरपतवारनाशक का प्रयोग फ्लैट फेन या डिफ्लेक्टर ०८ सफेद नोजल लगा हुए नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय नोजल के जमीन से ऊँचाई ०.३५ मी. होनी चाहिये, जिससे अधिक कोण का छिड़काव बनता है और एक समान स्प्रे होता है। खरपतवारनाशक को सिफारिश के अनुसार पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए।

**बाद की फसलों पर प्रभाव :** यह मिट्टी में जल्दी सड़ जाता है और इसमें मिट्टी प्रभावित नहीं होती है। बाद की फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है।

#### भण्डारण:

- खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में ताला – चाबी लगा कर रखें।
- खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिये, जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

**सावधानी:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को खरपतवारनाशी के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। **सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदी पहन कर ही इसका प्रयोग करें।** खरपतवारनाश का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें।

लागूतार एक ही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से खरपतवारों के प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि को काबू में लाने के लिए कई अन्य खेती योग्य उपाय योजनाओं के इस्तेमाल की सिफारिश की जा सकती है। खास सिफारिशों के लिए हमारे प्रतिनिधी की सहायता लें।

#### खाली डिब्बों का निपटारा:

- पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
- खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोड़ें।
- डिब्बों को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

**विषवत्तता के लक्षण:** अब तक कोई भी विष की घटना नहीं हुई है। प्रयोगशाला के परीक्षणों में चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण नहीं है, लेकिन शरीर में ढीलापन, बाल खड़े होना, झुककर बैठना, लार बहना और आँसू आना जैसे लक्षण दिखाई दिये।

**प्राथमिक उपचार:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएँ। **त्वचा में लगने पर :** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। **आँखों में चले जाने पर :** आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। **निगल जाने पर :** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुरन्त डॉक्टर को बुलाइयें। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

**विष प्रतिहार दवा :** कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

**निर्माता :** सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,

अमर पॅराडीम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे – ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत।

**फैक्टरी पता:** ग्राम निम्बुआ, तहसील डेरा बासी, जिला एसएस नगर (मोहाली), पंजाब-१४० २०१.

**विपणनकर्ता:** महिंद्रा समिट एग्रीसाइन्स लिमिटेड, महिंद्रा टॉवर्स, डॉ. जी. एम. भोसले मार्ग, पी के कुरणे चौक, वर्ली, मुंबई-४०००१८, भारत.

## Grash-X®

PINOXADEN 5.1% EC  
(Selective Herbicide)

Pinoxaden 5.1% EC is a selective post-emergence herbicide that is recommended for the control of important grass weeds like *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* in wheat. It contains 5.1% of the active ingredient pinoxaden which is equal to 50 g per Litre of the formulation.

Chemical Composition :	Contents (w/w)
Pinoxaden a.i	5.10%
<b>Safener :</b> cloquintocet mexyl	1.26%
<b>Emulsifying agents:</b>	
castor oil ethoxylate-30	5.05%
dodecyl benzene sulphonic acid, ca salt	2.02%
<b>Thickener :</b> Polystyrene	0.51%
<b>Adjuvant:</b> tris (2-ethylhexyl) phosphate	34.30%
<b>Solvents:</b>	
(tetrahydro-furan-2yl)-methanol	18.20%
Solvesso 200 ND	QS
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Application & Recommendation for use:** When used as per the recommendations given below, Pinoxaden 5.1% EC provides the post-emergence control of grasses particularly *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* in wheat.

Crop	Scientific name of the weed	Dosage per ha			Waiting period from last application to harvest (in days)
		a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)	
Wheat	Canary grass, <i>Phalaris minor</i> Wild oat, <i>Avena ludoviciana</i>	40-45	800 - 900	225-300	90

**Recommendations for use:** Apply as post emergence spray at 30-35 days after wheat sowing or when *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* is of 3-5 leaf stage.

**Mode of uptake:** Pinoxaden is rapidly absorbed by weed foliage and translocated to the growing points of leaves and stems. Susceptible weed species generally stop growing within 48 hours of treatment, turn yellow within one to three weeks and are completely controlled within three to five weeks.

**Method of application:** The herbicide is recommended to be applied using a knapsack sprayer fitted with a flat fan or a deflector nozzle 08 White (DFN 08), maintaining a constant nozzle height of 0.35 m which results in a wide angle fan spray with a narrow rectangular spray pattern. Apply the herbicide with the recommended quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.

**Re-cropping flexibility:** This is quickly degraded in the soil and has little or no soil activity. There are no restrictions on succeeding crops.

#### Storage:

- The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
- The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

**Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. **Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product.** Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. Also wash the contaminated clothes.

The repeated use of any herbicide or herbicide with the same mode of action could lead to selection of resistant weeds. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrate strategies that are available to manage such population. For specific recommendations, please contact our local representative.

#### Disposal of empty containers:

- Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
- Packages shall be broken and buried away from habitation.

**Symptoms of Poisoning:** No case of human poisoning is on record. In laboratory studies, poisoning symptoms in rodents were non-specific: decreased activity, piloerection, hunched posture, salivation and lachrymation.

**First Aid:** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. **IN CASE OF SKIN CONTACT:** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **IN CASE OF EYE CONTACT:** Rinse eyes with clean water for several minutes. **IN CASE OF INGESTION:** Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the attention of the medical doctor immediately. **NOTE:** Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

**Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

**Manufactured by :** Syngenta India Ltd.,

Amar Paradigm, S. No. 110/ 11/ 3, Baner Road, Pune – 411 045, Maharashtra, India.

#### Factory address :

Village Nimbua, Tehsil Dera bassi, District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140 201.

**Marketed by: Mahindra Summit Agriscience Limited,** Mahindra Towers, Dr. G. M. Bhosale Marg, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai-400 018, India.

## Grash-X®

PINOXADEN 5.1% EC  
(SELECTIVE HERBICIDE)

## ग्रास एक्स

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

**Manufactured by: Syngenta India Ltd.,**  
Amar Paradigm, S. No. 110/ 11/ 3, Baner Road,  
Pune-411 045, Maharashtra, India.

#### Factory address:

Village Nimbua, Tehsil Dera bassi,  
District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140 201.

**Marketed by: Mahindra Summit Agriscience Limited,**  
Mahindra Towers, Dr. G. M. Bhosale Marg,  
P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai-400 018, India.

#### निर्माता:

सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,

अमर पॅराडीम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड,

पुणे-४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.

#### फैक्टरी पता:

ग्राम निम्बुआ, तहसील डेरा बासी,

जिला एसएस नगर (मोहाली), पंजाब-१४० २०१.

#### विपणनकर्ता:

महिंद्रा समिट एग्री साईंस लिमिटेड,

महिंद्रा टॉवर्स, डॉ. जी. एम. भोसले मार्ग,

पी. के. कुरणे चौक, वर्ली, मुंबई-४०० ०१८, भारत.



**In case of consumer complaints / feedback, contact Marketing Manager at Mahindra Summit Agriscience Limited, Mahindra Towers, Dr. G. M. Bhosale Marg, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai-400 018, India. Tel. No: 18002661222 (Toll free) or email:cropcare@mahindra.com**

उपभोक्ता शिकायतों / प्रतिक्रिया के मामले में,

विपणन प्रबंधक से संपर्क करें,

महिंद्रा समिट एग्रीसाइन्स लिमिटेड,

महिंद्रा टॉवर्स, डॉ. जी. एम. भोसले मार्ग,

पी. के. कुरणे चौक, वर्ली, मुंबई-४०० ०१८, भारत.

टेलिफोन नं.: १८००२६६१२२२ (टोल फ्री) या

ईमेल:cropcare@mahindra.com

# ਗ੍ਰਾਮ ਐਂਕਸ

ਪੰਨਿਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ (ਚੇਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ ਇੱਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ*  ਅਤੇ *ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ*  'ਦੇ ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ੫.੧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਸ਼ਮਲ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ੫੦ ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।

<b>ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ<span> </span>:</b>	<b>ਤੱਤ (ਵ/ਵ)</b>
ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਕਿ.ਤ.	੫.੧੦%
<b>ਸੇਫ਼ਨਰ<span> </span>:</b> ਕਲੋਕੁਇੰਟੇਸਟ ਮੇਕਸੀਲ	੧.੨੬%
<b>ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਈੰਗ ਏਜੰਟ<span> </span>:</b>	
ਕੇਸਟਰ ਆਇਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟ – ੩੦	੫.੦੫%
ਡੋਡੀਸੀਲ ਬੇਨਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਏਸਿਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ	੨.੦੨%
<b>ਬਿਕਨਰ:</b> ਪੋਲੀਸਟੇਰੀਨ	੦.੫੧%
<b>ਐਡਜੂਵੈਂਟ<span> </span>:</b>	
ਟ੍ਰਿਸ (੨–ਏਥੀਲਹੋਕਸੀਲ) ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ	੩੪.੩੦%
<b>ਘੋਲਕ<span> </span>:</b>	
(ਟੇਟ੍ਰਾਹਾਈਡੋ–ਫ਼ੂਰਾਨ–੨ ਵਾਈਐਲ)–ਮੇਥਾਨੋਲ	੧੮.੨੦%
ਸੋਲਵੇਂਸੋ ੨੦੦ ਐਨਡੀ	ਕਿਉ. ਐਸ.
<b>ਕੁੱਲ</b>	<b>੧੦੦.੦੦%</b>

**ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :** ਜਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ*  ਅਤੇ *ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ*  ਵਰਗੇ ਘਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰ. ਚੈ.			ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਕਣਕ	<i>ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ</i> <i>ਜੰਗਲੀ ਜਵੀ</i>	੪੦–੪੫	੮੦੦–੯੦੦	੨੨੫–੩੦੦	੯੦

**ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :** ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ੩੦–੩੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ*  ਅਤੇ *ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ*  ੩–੫ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਗਣ–ਉਪਰਾਂਤ ਸਪ੍ਰੇ ਵਜੋਂ ਫਿੜਕੋ।

**ਪੌਦੇ ਰੁਆਰਾ ਸੋਖਵ ਦੀ ਵਿਧੀ :** ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਦੀਨ ਜਾਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ੪੮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਣੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹਨ ।

**ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :** ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫ਼ਫੈਟ ਫ਼ੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੀਫ਼ਠੈਕਟਰ ਨੋਸ਼ਲ ੦੮ ਵੂਈਟ (ਡੀਐਫ਼ਐਨ ੦੮) ਲਗਾ  ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਨੋਸ਼ਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ੦.੩੫ ਮੀਟਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦਾ ਫਿੜਕਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਰਿਕਰੋਂਗਲਰ ਸਪ੍ਰੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ।

**ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਲਚੀਲਪਣ :** ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ।

**ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਣ) :**

- ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।
- ਦਵਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ ।

**ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :** ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਵਰਤੋ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਵਰਾ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹਣ ਦਿਓ । ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਜਾਂ ਹਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। **ਤਵਰਾ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਬੜ ਕੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ । ਬਰਾਅਕਾਰੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਗਾਗਲਸ਼ ਅਤੇ ਬੂਟਾ।** ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ਫਿੜਕਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ । ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ । ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਧੋ ਲਓ ।

ਵਾਰ–ਵਾਰ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਐਂਗਰੋਨਾਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਮੀਬਤ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

**ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :**

- ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਯੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
- ਖਾਲੀ ਹੋ ਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਾਣ ।
- ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ।

**ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ :** ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਨ । ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਈਨੋਈਰੋਕਸ਼ਨ ਰੁੱਝ ਪੈਦਾ, ਲਾਰ ਟਾਪਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਬਰੂ ਵਗਣੇ ।

**ਫ਼ਸਟ ਏਡ :**

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖੋ । **ਤਵਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ 'ਤੇ:** ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਲਓ । **ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ :** ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। **ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ:** ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਲਾ ਬਾਰਬਾਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਡੋਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ । **ਨੋਟ:** ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਕਸਾਓ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿਓ ।

**ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ:** ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

**ਉਤਪਾਦਕ:** **ਸਿੱਜੌਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ,**

ਅਮਰ ਪਰਾਡੀਗਮ, ਐੱਸ.ਨੰ. ੧੧੦/੧੧/੩, ਬਾਨੇਰ ਰੋਡ, ਪੁਣੇ–੪੧੧ ੦੪੫, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ.

**ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪਤਾ :** ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਤਹਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਐੱਸਏਐੱਸ  ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ–੧੪੦ ੨੦੧.

**ਮੰਡੀਕਰਤਾ:** **ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਿਟ ਐਂਗਰੀਸਾਪਾਇੰਸ ਲਿਮਿਟੇਡ,** ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਾਵਰਜ਼, ਡਾ. ਜੀ. ਐਮ. ਭੋਸਲੇ, ਪੀ. ਕੇ. ਕੁਰਨੇ ਚੌਕ, ਵਰਲੀ, ਮੁੰਬਈ–400 018, ਭਾਰਤ.

# ਗ਼ਰਾਸ ਏਕਸ

ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ੫.੧% ੈਂਸੀ (ਨਿਵਡਕ ਤਪਨਾਸ਼ਕ)

ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ੫.੧% ੈਂਸੀ ਏ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਭ ਨਿਵਡਲੇਲੇ ਪ਼ਾਦੁਮਾਵ ਙ਼ਾਲ਼ਯਾਨੰਤਰਚੇ ਤਪਨਾਸ਼ਕ ਅਸ਼੍ਰੂਨ ਤੇ *ਫਾਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਆਧਿ *ਏਵੇਨਾ ਲੁਡੋਵ੍ਹਿਲਿਯਾਨਾ* ਛਾਂਸਾਰਖ਼ਯਾ ਮਠਵ੍ਯਾਘ੍ਯਾ ਗਵਰੀ ਤਪਾਂਘ੍ਯਾ ਨਿਯੰਤਰਾਜ਼ਾਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਭਤ: ਗਵ਼ਾਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੁਚਕਲੇ ਜਾਨੇ. ਤ੍ਯਾਮਘ੍ਯੇ ੫.੧% ਸਕ੍ਰਿਯ ਘਟਕ ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ਅਸ਼੍ਰੂਨ ਤੇ ਫਾੱਜ਼੍ਰੁਲੇਸ਼ਨਯਾ (ਪ਼ਰਮਾਣਾਘ੍ਯਾ) ਏਕੂਯ ੫੦ ਗ਼ੱਸ ਪ਼ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਫ਼ੁਰਕੇ ਅਸਰੇ.

<b>ਰਾਸਾਯਨਿਕ ਸੰਘਟਨਾ</b>	<b>ਘਟਕ (ਵ/ਵ)</b>
ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ਸ. ਘ.	੫.੧੦%
<b>ਸੇਫ਼ਨਰ:</b> ਕਲੋਕਿੰਟੋਸੇਟ ਮਿਕ੍ਰਿਸਲ	੧.੨੬%
<b>ਡਮਲ੍ਰਿਸਫਾਡੰਗ ਏਜੇਂਟ<span> </span>:</b>	
ਕੌਂਸਟਰ ਟੇਲ ਫ਼ੁਥੋਕ੍ਰਿਸੇਲੇਟ– ੩੦	੫.੦੫%
ਡਾੱਡੇਸਿਲ ਭੌਡ਼ਿਨ ਸਲਫਾੱਨਿਕ ਏਸਿਡ, ਸੀਏ ਸਾੱਲਟ	੨.੦੨%
<b>ਥਿਕਨਰ<span> </span>:</b> ਪਾਲੀਲਸਟੀਰੀਨ	੦.੫੧%
<b>ਏਡਜੂਵਂਟ<span> </span>:</b> ਟ੍ਰਿਸ (੨– ਫ਼ੁਥੀਲਿਕ੍ਰਿਸਲ) ਫਾੱਸਫੇਟ	੩੪.੩੦%
<b>ਦ਼ਾਕਕ<span> </span>:</b> (ਟੇਟ੍ਰਾਠਾਘਡ਼੍ਰੋ ਫਯੂਰੌਂ– ੨ ਕਾਯਏਲ)– ਸਿਥੇਨਾੱਲ	੧੮.੨੦%
ਸਾੱਲਵੇਂਸੋ ੨੦੦ ਏਨਡੀ	ਕਯੂਏਸ
<b>ਏਕੂਯ</b>	<b>੧੦੦.੦੦%</b>

**ਕਾਧਰਯਾਚੀ ਪਫ਼ਟਰੀ ਆਧਿ ਨਿਰ್ದੇਸ਼:** ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਲੇਲ੍ਯਾ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਾਂਪ਼ਰਮਾਯੇ ਕਾਧਰਤਾਨਾ, ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ੫.੧% ੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਭਤ: ਗਵ਼ਾਕਰੀਲ *ਫਾਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਆਧਿ *ਏਵੇਨਾ ਲੁਡੋਵ੍ਹਿਲਿਯਾਨਾ* ਠ੍ਯਾ ਤਪਾਂਘ੍ਯਾ ਪ਼ਾਦੁਮਾੰਕਾਨੰਤਰਚੇ ਨਿਯੰਤਰਾ ਕਰਨੇ.

ਪੀਕ	ਤਪਾਥੇ ਕੈਂਡ਼ਾਨਿਕ ਨਾਕ	ਪ਼ਰਤਿ ਫ਼ੈਕਟਰ ਮਾਤ਼ਰਾ			ਸ਼ੇਕਟਯ੍ਯਾ ਕਾਧਰਾਪਾਸ਼੍ਰੁਨ ਕਾਧਧੀਪੌਰ੍ਯਤਕਾ ਕਾਟ ਪਾਠ੍ਯਯਾਥਾ ਕਾਲਾਕਧੀ (ਦਿਕ੍ਯ)
		ਏ. ਆਯ. (ਗ਼ੋਂ)	ਸਿਸ਼੍ਰਧਾਨੁਸਾਰ ਮਾਤ਼ਰਾ (ਸਿਲੀ)	ਪਾਧ੍ਯਾਤੀਲ ਟ਼ਰਾਕਯ (ਲੀ)	
ਗ਼ਠ੍ਰ	ਕੌਂਨਾਰੀ ਗ਼ਰਾਸ, <i>ਫਾਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ</i> , ਕਾਈਲਡ ਔਟ, <i>ਏਵੇਨਾ ਲੁਡੋਵ੍ਹਿਲਿਯਾਨਾ</i>	੪੦–੪੫	੮੦੦–੧੦੦	੨੨੫–੩੦੦	੧੦

**ਕਾਧਰਾਸਾਰੀ ਨਿਰ್ದੇਸ਼:** ਪ਼ਾਦੁਮਾੰਕਾਨੰਤਰਚਾ ਫਕਾਰਾ ਮਠ੍ਯੂਨ ਗ਼ਠ੍ਰ ਪੈਰਲ੍ਯਾਨੰਤਰ ੩੦– ੩੫ ਦਿਕ੍ਯਸਾਂਨੀ ਕਿੰਕਾ *ਫਾਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਆਧਿ *ਏਵੇਨਾ ਲੁਡੋਵ੍ਹਿਲਿਯਾਨਾ* ਠੇ ੩–੫ ਦਿਕ੍ਯਸਾਚ੍ਯਾ ਪਾਨਾਘ੍ਯਾ ਕਾਫੀਘ੍ਯਾ ਟਪ੍ਧ੍ਯਾਕਰ ਅਸਤਾਨਾ ਫਕਾਰਾ.

**ਥੇਟਲੇ ਜਾਧ੍ਯਾਥਾ ਪ਼ਕਾਰ:** ਪਿਨਾੱਕਸੇਡੇਨ ਠੇ ਤਪਾਘ੍ਯਾ ਪਾਲਕੀਫ਼ਜ਼ਰੇ ਤਕਕਾਲ਼ ਸ਼ਾਧ੍ਰੂਨ ਥੇਟਲੇ ਜਾऊਨ ਧਾਨੇ ਆਧਿ ਖ਼ੋਡ਼ਾਘ੍ਯਾ ਕਾਠਗਾ–ਯਾ ਬਿੰਦੁਪੌਰ੍ਯਤ ਨੇਲੇ ਜਾਨੇ. ਤਪਚਾਰ ਕੇਲ੍ਯਾਨੰਤਰ ਠ੍ਯਾਘ੍ਯਾ ਕਿਰੁਡ਼ ਕਮਕੁਕ੍ਯਤ ਅਸਲੇਲ੍ਯਾ ਤਪਾਘ੍ਯਾ ਪ਼ਜਾਜੀ ੪੮ ਤਾਸਾਂਘ੍ਯਾ ਆਤ ਕਾਠਗੇ ਥਾਂਕਕਰੇ, ਏਕ ਤੇ ਤੀਨ ਆਡਕਡ਼ਯਾਂਘਯੇ ਪਿਕਯਯਾ ਠੋਜਾਤ ਆਧਿ ਤੀਨ ਤੇ ਪਾਚ ਆਡਕਡ਼ਯਾਂਘਯੇ ਸੰਪੂਰ੍ਜਿਤ: ਨਿਯੰਤਿਰ ਠੋਜਾਤ.

**ਨਾਕਧਾਯਾਚੀ ਪਫ਼ਟਰੀ:** ਸਪਾਟ ਫੌਂਨ ਕਿੰਕਾ ਡਿਫਲੇਕਟਰ ਨਾੋਙਲ ੦੮ ਫ਼ਾਡ਼ੈਟ (ਡੀਏਫਕਨ ੦੮) ਕਾਧਰੁਨ ਕ. ੦.੩੫ ਮੀਟਰ ਫ਼ੁਰਕੀ ਸ੍ਰਿਥਿਰ ਨਾੋਙਲ ਤੁੰਚੀ ਠੈਕ੍ਰੂਨ ਨੌੱਪਸੌਂਕ ਸ਼੍ਰੇਯਰਚ੍ਯਾ ਸਠਾਯ੍ਯਾਨੇ ਠੇ ਤਪਨਾਸ਼ਕ ਫਕਾਰਲੇ ਜਾਨੇ ਆਧਿ ਠ੍ਯਾਮੁਲੇ ਅਰੁੰਦ ਆਧਤਾਕਾਰ ਫਕਾਯ੍ਯਾਘ੍ਯਾ ਆਕਾਰਮਘਯੇ ਮਾੇਲਯਾ ਕਾਨਾਤ੍ਰੂਨ ਫੌਂਨ ਸ਼੍ਰੇੇ ਸਿਙਲਤੋ. ਤਪਾਂਘ੍ਯਾ ਪਾਲਕੀਕਰ ਯਾਯ੍ਯ ਪਕਾਰੇ ਪਧਰਾਕੇ ਮਠ੍ਯੂਨ ਪਾਧ੍ਯਾਘ੍ਯਾ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਿਤ ਯਾਯ੍ਯ ਪ਼ਰਮਾਣਾਸਠ ਠੇ ਤਪਨਾਸ਼ਾਕ ਕਾਧਰਾ.

**ਪੁਨਪੀੱਕ ਲਕ੍ਯਕਿਕਤਾ:** ਠੇ ਤਕਕਾਲ਼ ਜਮਿਨੀਮਘਯੇ ਵਿਲਯ ਪਾਕਰੇ ਆਧਿ ਤ੍ਯਾਕੀ ਜਮਿਨੀਮਘਯੇ ਨਾਧਯ ਪ਼ਰਤਿਕ੍ਰਿਯਾ ਠੋਜੇ ਕਿੰਕਾ ਠੋਜਰੀ ਨਾਈ. ਪੁਡੀਲ ਪਿਕਾਂਘ੍ਯਾ ਕਾਧਰਾਸਾਰੀ ਕਾਈਈ ਨਿਬੰਠ ਨਾਈ਼.

**ਸਾਰਕਯ :**

- ਤਪਨਾਸ਼ਕ ਅਸਲੇਲੇ ਪੌਂਕੇਟ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਸਰੰਘਯੇ ਕੇਗਯਯਾ ਖ਼ੋਲ੍ਯਾ ਕਿੰਕਾ ਪਰਿਸਰਾਮਘਯੇ ਆਧਿ ਅਨ੍ਯ ਕਰ੍ਰੁ (ਵਿਸ਼ੇਭਤ: ਖ਼ਾਫ਼ਾ ਪਦਾਰਠ) ਠੇਕਧਯਾਘ੍ਯਾ ਜਾਗੇਪਾਸ਼੍ਰੂਨ ਕ ਖ਼ੋਲੀਪਾਸ਼੍ਰੁਨ ਕੇਗਲੇ ਆਧਿ ਸ਼ਕਯਤੋ ਕੁਰੁਲੁਪ ਕ ਕਿਲ਼ੀ ਅਸਲੇਲ੍ਯਾ ਦੁਸ–ਯਾ ਕਪਾਟਮਘਯੇ ਠੇਕਲੇ ਗੇਲੇ ਪਾਠਿਜੇ.
- ਤਪਨਾਸ਼ਕ ਠੇਕਧਯਾਸਾਰੀ ਕਾਧਰਯਯਾਤ ਯੇਧਾਰੀ ਖ਼ੋਲੀ ਕਿੰਕਾ ਜਾਗਾ ਯਾਯ੍ਯ ਕਾਂਠਲੇਲੀ, ਕਾਰਡੀ, ਪੁਰੇਸ਼ੀ ਪਕਾਸ਼ਿਤ ਆਧਿ ਠਵਾ ਅਸਲੇਲੀ ਅਸਾਕੀ ਆਧਿ ਤੀ ਪੁਰੇਸ਼ੀ ਮਾੇਰੀ ਅਸਾਕੀ, ਜੇਯੇਕਰੁਨ ਕਾਫੇਚਾ ਸੰਸਰਾਂ ਤ੍ਯਾਸ ਠੋਧਾਗਰ ਨਾਈ.

**ਸਾਕਧਾਨਤਾ :** ਸ਼੍ਰੇੇ ਟ਼ਰਾਕਯ ਕਨਕਧਯਾਸਾਰੀ ਸ੍ਵਯਤੰਪਾਕਾਚੀ ਖਾਂਡੀ ਕਾਧਰੁ ਨਯੇ. ਸ਼੍ਰੇੇ ਟ਼ਰਾਕਯ ਠਲਕਧਯਾਸਾਰੀ ਕਾਠੀ ਕਾਧਰਾ. ਤ੍ਕਥਾ, ਡਾੇਲੇ ਆਧਿ ਕਾਪਡ਼ਯਾਂਸ਼ੋਕਤ ਸੰਪਕੱ ਯੇऊ ਕੇऊ ਨਕਾ. ਠੁਕੇ ਆਧਿ ਕਾਫਾ ਛਾਨਾ ਖ਼ਾਸਾਕਾਟੇ ਘੇਯੇ ਟਾਕਾ. **ਤ੍ਕਚੇਸ਼ੋਕਤ ਸੰਪਕੱ ਯੇऊ ਨਯੇ ਮਠ੍ਯੂਨ ਠਾਤਮਾੇਯੇ ਕਾਧਰਾ. ਸੰਚਕਕ ਕਾਪਡੇ, ਸਾਰਕ, ਗਾਂਗਲ੍ਸ ਆਧਿ ਕੂਟ ਕਾਧਰੁਨ ਤ੍ਕਪਾਦਨ ਠਾਤਾਕਾ.** ਤ੍ਕਪਾਦਨ ਕਾਧਰਤ ਅਸਤਾਨਾ ਖ਼ਾऊ, ਪਿऊ ਕਿੰਕਾ ਠੁਸ਼੍ਰਪਾਨ ਕਰੁਨ ਨਕਾ. ਕਾਮ ਙ਼ਾਲ੍ਯਾਸ ਸਾਕਯ ਆਧਿ ਪੁਰੇਸ਼ਾ ਪਾਧ੍ਯਾਨੇ ਠਾਤ ਠੁਯਾ ਆਧਿ ਕਾਪਡੇ ਕਠਕਾ. ਤਪਨਾਸ਼ਾਕ ਠਵੇਘ੍ਯਾ ਆਧਿ ਜਲਾਸ਼ਯਾਘ੍ਯਾ ਸੰਪਕਾੱਟ ਯੇऊ ਕੇऊ ਨਕਾ. ਦ੍ਰੁਥਿਤ ਙ਼ਾਨੇਲੇ ਕਾਪਡੇਚੁਡ਼ਠਾ ਠੁਯਾ.

ਕਾਰੰਕਾਰ ਕਿੰਕਾ ਏਕਾਚ ਪਕਾਰੇ ਕਾਯੇਠੇਈ ਤਪਨਾਸ਼ਾਕ ਸਾਰਕ਼ ਕਾਧਰਲ੍ਯਾਮੁਲੇ ਤਯ ਤ੍ਯਾਪਾਸ਼੍ਰੂਨ ਰੋਠਕ ਕਨ੍ਰੁ ਸ਼ਕਾਤਾ. ਕਾਈ ਕੂਥੀਸ਼ਾਸ਼੍ਰਣੀਯ ਪਫ਼ਟਰੀਮੁਲੇ ਤਯ ਰੋਠਕ ਕਨਧਯਾਚੀ ਸ਼ਕਯਤਾ ਕਮੀ ਠੋऊ ਸ਼ਕਰੇ. ਜ੍ਯਾ ਸ਼ੇਤਾਮਘਯੇ ਰੋਠਕ ਤਯ ਅਸਲ੍ਯਾਚਾ ਸੰਚਾਯ ਅਸਲੇ, ਤਿਥੇ ਅਸ਼ਾ ਪ਼ਾਦੁਮਾੰਕਾਘ੍ਯਾ ਕ੍ਯਕ੍ਥਪਾਨਾਸਾਰੀਠੇ ਤਪਾਯ ਏਕ੍ਰਿਤ ਕਾਧਰਾ. ਵਿਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਾਂਸਾਰੀ, ਫ਼੍ਰਯਪਾ ਆਮਘ੍ਯਾ ਸ੍ਥਾਨਿਕ ਪ਼ਰਤਿਨਿਠੀਸ਼ੀ ਸੰਪਕੱ ਕਰਾ.

**ਰਿਕਾਨ੍ਯਾ ਕੰਟੇਨਸਰੰਚੀ ਵਿਲ੍ਠੈਕਾਟ:**

- ਯੰਚੇ ਆਧਿ ਕੰਟੇਨਸਰੰਮਘੀਲ ਪੌਂਕੇਜੇਸ ਕਿੰਕਾ ਅਤਿਰਿਕ਼ ਸਾਠਿਲ੍ਯ ਕ ਠੁਯਟਲੇਲੇ ਸਾਠਿਲ੍ਯ ਠ੍ਯਾਕੀ ਧਕਾਕਰਯ ਆਧਿ ਜਲ ਪ਼ਦ੍ਰੁਥਯ ਠੋऊ ਨਯੇ, ਮਠ੍ਯੂਨ ਸੁਚਕ੍ਰਿਤ ਪਕਾਰੇ ਵਿਲ੍ਠੈਕਾਟ ਕਾਕਲੀ ਗੇਲੀ ਪਾਠਿਜੇ.
- ਪੁਨ: ਕਾਧਰ ਠੋऊ ਨਯੇ ਮਠ੍ਯੂਨ ਕਾਧਰਲੇਲੇ ਪੌਂਕੇਜੇਸ ਕਾਠੈਰ ਟਾਕ੍ਰੁ ਨਯੇਟ.
- ਪੌਂਕੇਜੇਸ ਤਾੋਡ਼ੁਨ ਕਰ੍ਰੁਤੀਪਾਸ਼੍ਰੂਨ ਦ੍ਰੁ ਕੁਰਲੇ ਗੇਲੇ ਪਾਠਿਜੇਤ.

**ਕਿਥਕਾਥੇਚੀ ਲਕ਼ਯੇ:** ਆਜਕਰ ਮਾਨਕੀ ਕਿਥਕਾਥਾ ਨਾਂਦਕਯਯਾਤ ਆਲੇਲੀ ਨਾਈ. ਪ਼ਰਯੋਗਸ਼ਾਛੇਤੀਲ ਅਧ੍ਯਾਸਾਂਮਘਯੇ, ਤੁੰਦੀਰ (ਚੌਂਡੰਟ) ਮਘੀਲ ਕਿਥਕਾਥੇਚੀ ਲਕ਼ਯੇ ਰਕਾਕਿਕ ਨਕ਼ਟਰੀ: ਅਸ਼ਕੁਪਯਾ, ਕੇਸ ਤਾਠ ਠੋਯੇ. ਙ਼ਾੋਕ ਕਿੰਕਾ ਕਾਕ ਯੇਯੇ, ਲਾਲ਼ ਗਕਯੇ ਆਧਿ ਅਠ੍ਰੁ ਯੇਯੇ.

**ਪ਼ਾਥਮਿਕ ਤਪਚਾਰ :** ਪ਼ਠਾਕਿਤ ਙ਼ਾਲੇਲ੍ਯਾ ਕ੍ਯਕੀਲਾ ਮਾੋਕਕਯਾ ਠਕੇਸਾਰੀ ਪੁਰੇਸ਼ੀ ਠਵਾ ਅਸਲੇਲ੍ਯਾ ਜਾਗੀ ਠਲਕਾ ਆਧਿ ਤ੍ਯਾਲਾ ਖੰਡੀਪਾਸ਼੍ਰੂਨ ਸੰਚਕ਼ਯ ਠਾ. **ਤ੍ਕਚੇਸ਼ੀ ਸੰਪਕੱ ਆਲਾ ਅਸਲ੍ਯਾਸ:** ਦ੍ਰੁਥਿਤ ਕਾਪਡੇ ਕਾਠਾ ਆਧਿ ਸਾਕਯ ਆਧਿ ਪਾਧ੍ਯਾਨੇ ਸ਼ਾਰੀਰਾਚੇ ਦ੍ਰੁਥਿਤ ਙ਼ਾਲੇਲੇ ਠਾਗ ਸੰਪੂਰ੍ਜ ਸ੍ਵਚਙ ਠੁਯਾ. **ਡਾੋਕਯਾਸ਼ੀ ਸੰਪਕੱ ਆਲਾ ਅਸਲ੍ਯਾਸ:** ਸ੍ਵਚਙ ਪਾਧ੍ਯਾਨੇ ਕਿ੍ਯੇਕ ਮਿਨਿਟੇ ਡਾੇਲੇ ਸ੍ਵਚਙ ਠੁਯਾ. **ਪਾਟਾਕਾਟੇ ਆਤ ਗੇਲੇ ਅਸਲ੍ਯਾਸ:** ਪਾਧ੍ਯਾਘ੍ਯਾ ਮਾੇਲਕਾ ਪ਼ਰਮਾਣਾਸਠ ਕੈਚਕੀਯ ਚਾਰਕਾੇਲੇ ਕਾਰੰਕਾਰ ਤਪਾਯ ਕਰਾ. ਤਕਕਾਲ਼ ਡਾੱਕਟਰਾਂਚੇ ਕੈਚਕੀਯ ਸਠਾਯ ਕੋਲਾਕ੍ਰੂਨ ਠ੍ਯਾ. **ਸ਼੍ਰੁਚਨਾ:** ਕੈਸ਼ੁਡ਼ ਅਸਲੇਲ੍ਯਾ ਕ੍ਯਕੀਲਾ ਤਾਂਡਾਕਾਟੇ ਕਠੀਈ ਕਾਈਈ ਕੇऊ ਨਕਾ ਕਿੰਕਾ ਜਾੇਰ ਕਾਕ੍ਰੂਨ ਤੁਲਟੀ ਕਰਾਯਲਾ ਕਾਕ੍ਰੂ ਨਕਾ.

**ਕਿਥਾਕਰੀਲ ਤਤਾਰਾ:** ਕਾਯੇਤਾਈ ਵਿਸ਼ਿਫ਼ਟ ਤਤਾਰਾ ਙ਼ਾਾਤ ਨਾਈ. ਲਕ਼ਯਾਂਪ਼ਰਮਾਯੇ ਤਪਚਾਰ ਕਰਾ.

**ਤ੍ਕਪਾਦਕ:** **ਸਿੱਜੌਟਾ ਫ਼ੰਡਿਯਾ ਲਿਮਿਟੇਡ,**

ਅਮਰ ਪੱਰਾਡੀਮ, ਕਾਢੋਂ. ਨ. ੧੧੦/੧੧/੩, ਕਾਯੇਰ ਰੋਡ, ਪੁਯੇ– ੪੧੧੦੪੫, ਮਠਾਰਾਙ਼, ਠਾਰਤ.

**ਫੌਂਕਟਰੀਯ ਪਤਾ:** ਗਾਕ ਨਿਮ੍ਰੁਠਾ, ਤਾਲੁਕਾ ਡੇਰਾ ਕਾਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਸਏਏਸ ਨਗਰ (ਮਾੋਠਾਲੀ), ਪੰਜਾਕ– ੧੪੦ ੨੦੧.

**ਕਿਕੇਲਾ:** **ਮਠਿੰਡਾ ਸਮਿਟ ਅੰਗ਼ਰੀਸਾਯਨ੍ਸ ਲਿਮਿਟੇਡ,** ਮਠਿੰਡਾ ਟਾੱਕਰ੍ਸ, ਡਾਂ. ਜੀ. ਏਮ. ਠਾੋਸਲੇ, ਪੀ. ਕੇ. ਕੁਰ੍ਯੋਂ ਚਾੱਕ, ਕਰਕੀ, ਮੁੰਬਕੈ– ੪੦੦ ੦੧੮, ਠਾਰਤ.

# ਗ਼ਰਾਸ ਐਂਕਸ

ਪਿਨੋਕ਼ਸਾਡੇਨ ੫.੧% ੈਂ.ਸੀ. (ਯੁਨਿੰਦੁ ਨਿੰਦਾਮਾਯੁਨਾਸ਼ਕ)

ਪਿਨੋਕ਼ਸਾਡੇਨ ੫.੧% ੈਂ.ਸੀ. ਯੁਨਿੰਦੁ ੁੰਦੁਲਕ ਖਧਈ ਕਧਰਾਸ਼ ਮਾਡੇਨੂੰ ਨਿੰਦਾਮਾਯੁਨਾਸ਼ਕ ੇ ੜੇਨੀ ਕਠਾਮਾਯੁ ਖਠਿੰਸਾਂ ਖਠਾ ਮਠੁਕ-੧ਨਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿੰਦਾਮਾਯੁ ੜੇਂਕਾਂ ਤੇ *ਫ਼ੇਕਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਅਨੇ *ਅੰਕੀਨਾ ਕੁਡੀਕਿਲਿਯਾਨਾ* ਨਾ ਨਿਯੰਤਰਾਯੁ ਮਾਟੇ ਕਰਵਾਸਾਂ ਆਕੇ ੇ. ਤੇ ੫.੧% ਸਕ੍ਰਿਯ ਘਟਤ ਪਿਨੋਕ਼ਸਾਡੇਨ ਖਰਾਕੇ ੇ *ਕੋ* ਪ਼ਰਤਿ ਕੀਟ੨ ੫੦ ਗ਼ਰਾਮ ਸੰਯੋਕਰਨ ਕਰਾਕਰ ੇ.

<b>ਰਾਸਾਯਿ੍ਰਿਤ ਸੰਕਰਯਨਾ<span> </span>:</b>	<b>ਮਾਤ਼ਰਾ (ਕ/ਕ)</b>
ਪਿਨੋਕ਼ਸਾਡੇਨ ਸ.ਘ.	੫.੧੦%
<b>ਸੇਫ਼ਨਰ:</b> ਡਕਾੋਫਿਕੰਟੋਸੇਟ ਮੇਫ਼ਿਕਲ	੧.੨੬%
<b>ਓਮਕ੍ਰਿਸਫ਼ਾਡੀੰਯ ਐਂਕਟ੍ਰੇਸ:</b>	
ਡੇ੨ਟਰ ਆੱਠਿਯ ਓਥਾੋਕ੍ਰਿਸਕੇਟ– 30	੫.0੫%
ਡੀ੨ਸੀਕ ਠੇਨਿੰਙਨ ਕਲ੍ਫ਼ਡੀਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਡ੍ਰਿਕ੍ਰਿਯਮ ਕਾੋਡਟ	੨.੦੨%
<b>ਥਿਤਨਰ:</b> ਪੌਕ	