Size: 504 mm x 280 mm

Chess®

PYMETROZINE 50% WG

INSECTICIDE

(For import only)

चेस

पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू.जी.

कीटनाशक

(केवल आयात के लिए)

syngenta®

Manufactured by :
Syngenta Korea Limited.
IKSAN Plant, 642 Seokam-Dong,
Iksan City, Jeonbuk Province
570-330, Korea.

Imported, repacked and marketed by:
Syngenta India Limited
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune - 411 045.
Maharashtra, India.

Factory address:
Plot No.1,
Swastik Ceramic compound,
Sankarda, Dist. Vadodara,
Gujarat-391350, India.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive.
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S.No. 110/11/3, Baner Road,
Pune-411045, Maharashtra, India
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310
Email:customercare.india@syngenta.com.

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करे.
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅरादीम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे-४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री : १८०० २००१ ३१०
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

IN4071928

Chess®

PYMETROZINE 50% WG

INSECTICIDE

(For import only)

Pymetrozine 50% WG is a systemic insecticide; and is recommended for the control of brown plant hopper in rice crop. Foliar pests not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50%WG. Pests stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray.

Composition	**Contents % (w/w)**
Pymetrozine a.i.	50.00
Wetting and dispersing agents:	
Lignosulfonic acid sodium salt	10.00
Mixture of isomers of dibutylnaphthalene sulfonic acid sodium salt	5.00
Antifoaming agents:	
Polydimethylsiloxane	0.20
Carriers:	
Sodium sulphate	5.00
Urea, polymer with formaldehyde	10.00
Silicium oxide	QS
Total	**100.00%**

Application & Recommendation for use: When used as per the recommendations given below, Pymetrozine 50% WG provides control of brown plant hopper in rice crop.

Crop	Common name of the Pest	Dosage per ha a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)	Waiting period from last application to harvest (in days)
Rice	Brown plant hopper	150	300	500	19

Directions for use:
Measure the required quantity of insecticide and mix it in small quantity of water and gradually add the rest of the water to prepare solution. Apply with knapsack sprayer when pest appears on the crop and repeat if necessary as per pest incidence. Maximum two sprays to be given starting first spray at initial pest infestation reaching Economic Threshold Level (ETL).

Storage :
1. The packages containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide. Also wash the contaminated clothes.

Caution: Pymetrozine 50%w/w WG is not to be used on crops other than specified on this Leaflet.

Disposal of empty containers:
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning :
Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptoms of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract; hypoactivity, lacrimation, dyspea, soft stool; red stained urine; tremors, hypothermic to touch; erythema etc.

First Aid:
Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him undercooling. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Get the attention of the medical doctor immediately. **NOTE:** Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glass of water to drink if conscious and alert.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Manufactured by : Syngenta Korea Limited.
IKSAN Plant, 642 Seokam-Dong, Iksan City, Jeonbuk Province 570-330, Korea.

Imported, repacked and marketed by:
Syngenta India Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road, Pune-411 045, Maharashtra, India.
Factory address:
Plot No. 1, Swastik Ceramic compound, Sankarda, Dist. Vadodara, Gujarat-391350, India.

चेस

पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू.जी.

कीटनाशक

(केवल आयात के लिए)

पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू.जी. एक अंतरप्रवाही कीटनाशक है । पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू. जी. की सिफारिश धान में आनेवाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए की जाती है । जो कीटड्स कीटनाशक के सीधे संपर्क में नहीं आते यह उनको भी रोकता है। कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते हैं और कुछ दिन में मर जाते हैं।

संरचना	**मात्रा % (भार/भार)**
पाइमेट्रोजिन स.त.	५०.००
भीगोने और घुलने वाले तत्व :	
लिग्नोसल्फोनिक एसिड सोडियम लवण	१०.००
डाइब्यूटाइलनैप्थलिन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण	५.००
एंटिफोमिंग एजेंट :	
पोलिडाइमिथाइलसाइलोक्ज़ेन	०.२०
सहायक :	
सोडियम सल्फेट	५.००
यूरिया, फोरमेल्डिहाइड का पोलिमर	१०.००
सिलिशियम ऑक्साइड	पर्याप्त मात्रा
कुल	**१००.००%**

सिफारिश: नीचे दिये गये सिफारिशों के अनुसार पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू.जी. का इस्तेमाल करने से धान में आनेवाले भूरा पत्ती टिड्डा का नियंत्रण किया जा सकता है।

फसल	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
धान	भूरा पत्ती टिड्डा	१५०	३००	५००	१९

इस्तेमाल का तरीका :
कीटनाशक की निर्दिष्ट मात्रा को थोड़े पानी में घोल लें, अच्छे से घुलने पर बाकी पानी मिला लीजिए । कीटनाशक का इस्तेमाल कीट के दिखाई देने के तुरंत बाद और उस के बाद यदि आवश्यकता हो, तो दोबारा स्प्रे कीट की मौजूदगी के आधार पर नैपसैक स्प्रेयर से करें। अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरू होने पर एवं आर्थिक हानि के स्तर (ई.टी.एल.) की अवस्था पहुँचने पर करें।

भण्डारण:
१.कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में ताला–चाबी लगाकर रखें ।
२.कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिये, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो ।

सावधानी: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें । त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके । सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें । कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना और धूम्रपान नहीं करना चाहिए । प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़ा बदल लें । दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें ।

सावधान: पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू. जी. का इस्तेमाल इस लीफलेट(पर्चा) में दर्शायी गयी फसलों के अलावा किन्हीं और फसलों में नहीं किया जाना चाहिए ।

खाली डिब्बों का निपटारा:
१.पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बे, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें ।
२.खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोड़ें ।
३.डिब्बों को तोड़–मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए ।

विषक्तता के लक्षण:
जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर केअन्दर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभाव्य है। विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते हैं : आँखों त्वचा व सांस की नली में जलन; क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आँसू आना; सांस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना; लाल मूत्र होना, कँपकँपी आना; छूने पर ठंडा लगना; त्वचा पर लाल दाने होना, इत्यादि ।

प्राथमिक उपचार:
प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं और तापमान से बचाएं । **त्वचा में लगने पर:** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन तथा पानी से अच्छी तरह धोएँ । **आँखों में चले जाने पर:** आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए । **निगल जाने पर:** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार–बार दें और तुरन्त डाक्टर को बुलाइये । **सूचना :** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करें। मुँह को पानी से छपछपाएँ और अगर सतर्क व होश मे हो तो एक या दो गलास पानी पीनें को दें ।

विष प्रतिहार दवा : कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें ।

निर्माता :
सिन्जेंटा कोरीआ लिमिटेड
इंकसान (आयकेएसएन) प्लान्ट, ६४२ सिओकाम–डॉंग, इंकसान (आयकेएसएन) सिटी, जीओबल प्रोविन्स ५७०–३३०, कोरीया.

आयातकर्ता, पुन: पैकिंग : एवं विपणनकर्ता :
सिन्जेंटा इंडिया लिमिटेड, अमर पेराडाइम, स.न. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी का पता :
प्लॉट नं. १, स्वास्तिक सिरेमिक कम्पाउंड, सन्कार्डा जिला बड़ौदरा, गुजरात–३९१ ३५०, भारत।

चेस

पायमेट्रोजिन ५०% डब्ल्युजी

कित्कनाशक

(फक्त आयातसाठी)

पायमेट्रोझाईन ५०% डब्ल्युजी हे एक प्रणालीगत काम करणारे किटकनाशक असून भातावर पडणाऱ्या ब्राऊन प्लान्ट हॉपर किडीवर नियंत्रण देण्यासाठी ते वापरण्याची शिफारस करण्यात येते. फवारणीच्या आवाक्यात प्रत्यक्षपणे न आलेल्या पालवीवरील किडीवर देखील पायमेट्रोझाईन ५०% डब्ल्युजी मुळे नियंत्रण राहते. फवारणीनंतर किडी अन्नग्रहण थांबवतात व हळूहळू मरतात.

रचना:	**प्रमाण % (डब्ल्यु/डब्ल्यु)**
पायमेट्रोझाईन ए. आय.	५०.००
ओलावा आणणारे व पातळ करणारे घटक:	
लिग्नोसल्फोनिक ॲसिड सोडीयम सॉल्ट	१०.००
डायब्युटीलनाफथालीन सल्फोनिक ॲसिड सोडीयम सॉल्ट्सचा आयसोमर्सचे मिश्रण	५.००
ॲन्टिफोमिंग एजन्ट्स:	
पॉलीडायमथीलसिलॉक्सेन	०.२०
वाहक:	
सोडीयम सल्फेट डिफेनोलीनाझोल ए. आय.	५.००
युरीया, फॉर्मल डिहाईडसह पॉलीमर	१०.००
सिलिसियम ऑक्साईड	क्यू.एस.
एकूण:	**१००.००**

वापर व वापरण्यासाठी शिफारस : पुढे दिलेल्या शिफारशीनुसार वापरल्यास पायमेट्रोझाईन ५०% डब्ल्युजी भातावर पडणाऱ्या ब्राऊन प्लान्ट हॉपर किडीवर नियंत्रण देवते.

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रती हेक्टर डोस ए. आय. (ग्रॅम)	द्रावण (मिली)	पाण्यात विरघळवणे (लि)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
भात	ब्राऊन प्लान्ट हॉपर	१५०	३००	५००	१९

वापरण्यासाठी सूचना:
किटकनाशकाचे आवश्यक तितके प्रमाण घ्या व थोडयाशा पाण्यात त्याचे मिश्रण तयार करा आणि फवारणीसाठी द्रावण तयार करण्याकरीता त्यामध्ये हळूहळू पाणी घाला. पिकावर किड पडल्यास दिसताच पाठीवर बांधावयाच्या पंपाने फवारणी करा आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा फवारणी करा. किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर पहिली फवारणी कित्यानंतर इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल (ईटीएल) गाठवल्यावर जास्तीत जास्त दोन वेळा फवारणी करा.

साठवणूक:
१. हे किटकनाशक असलेले पाकिट अन्य सामानसुमान, खास करून खाद्यपदार्थ देवण्यासाठी काढी वापरावी. फवारणीसाठी तयार केलेल्या द्रावणाचा ऊर्ध्व, तोंड व त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका. औषध श्वासाद्वारे पोटात जाणार नाही ह्याची काळजी घ्या. त्वचेशी संपर्क होऊ नये म्हणून हातमोजे वापरावेत. औषध हाताळताना अंगभर संरक्षक कपडे, मास्क, गॉगल्स व बूट घालावेत. फवारणी करत असताना धुम्रपान, पिणे–खाणे जपणे नको. साबण व पाण्याने हातपाय धुवा व फवारल्यानंतर अंगावरील कपडे बदला. किटकनाशक हवा व पाण्याच्या संपर्कात येण्यापासे टाळा. कळलेले दुन्हा वापरल्यापूर्वी धांगले धुवा.

व्यावयाची काळजी : हा माहितीपत्रिकेत दिलेल्या पिकाव्यतिरिक्त अन्य पिकासाठी पायमेट्रोझाईन ५०% डब्ल्यु/डब्ल्यु डब्ल्यूजी वापरू नये.

रिकामी डब्याची विल्हेवाट:
१. औषधाचे पाकिटे किंवा अतिरिक्त पदार्थ आणि मशीनमधील टाकाऊ पदार्थ आणि डबे ह्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावायी, जेणेकरून ग्लयुमुळे पर्यावरण व पाणी दूषित होणार नाही.
२. वापरलेले डबे बाहेर उघड्यावर फेकू नयेत कारण त्यांचा पुर्नवापर होण्यायी शक्यता असते.
३. डबे वापरल्यानंतर फोडून टाकावेत व मानवी वस्तीपासून दूरवर जमिनीखाली गाडावेत.

विषबाधा झाल्याची लक्षणे: खूप प्रमाणात किटकनाशक पोटात गेल्यावरीच गंभीर स्वरूपाची प्रणालीगत विषबाधा होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. विषबाधा झाल्याच्या लक्षणामध्ये डोळे, त्वचा चुरचुरणे व श्वसनमार्गात जळजळ होणे, शिथिलता येणे डोळ्यातून पाणी येणे, धाप लागणे, विष्ठा पातळ होणे, लघवीतून रक्त जाण्यासारखे वाटणे, थरथरणे, अंग खूप गार पडणे, त्वचा लालसर होणे असे होऊ शकते.

प्रथमोपचार:
त्या व्यक्तिला हवेशीर ठिकाणी किंवा मोकळ्या हवेत न्या आणि आवश्यक तितकाच थंडावा त्याला मिळू द्या, म्हणजे ती व्यक्ति गार पडणार नाही. त्वचेशी संपर्क आल्यास : औषध पडलेले अंगावरील कपडे काढा आणि भरपूर पाणी व साबणाने आंघोळ करा. औषध डोळ्यात गेल्यास : भरपूर पाण्याने क्लियेक मिनिटभर डोळे धुवा. औषध पोटात गेल्यास : ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा व वैद्यकिय उपचार घ्या. टिप : बेशुध्द असलेल्या व्यक्तिला ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका किंवा पिण्यासाठी काहीही देऊ नका. पाण्याने चूळ भरण्यास सांगा आणि ती व्यक्ति शुध्दीवर येऊन सावध असल्यास १ किंवा २ ग्लास पाणी प्यायला द्या.

विषनाशक: कोणताही विशिष्ट उपचार असा ठाऊक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

उत्पादक:
सिन्जेटा कोरीया लिमिटेड.
इंकसान (आयकेएसएन) प्लान्ट, ६४२ सिओकाम–डॉंग, इंकसान (आयकेएसएन) सिटी, जीओबल प्रोविन्स ५७०–३३०, कोरीया.

आयातकर्ता, पुनर्पॅककर्ता व विपणनकर्ता :
सिन्जेटा इंडिया लिमिटेड, अमर पॅरादाइम, सर्वे नं. ११०/११/३, बाणेर रोड, पुणे – ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फॅक्टरीचा पत्ता : प्लॉट नं. १, स्वास्तिक सिरॅमिक कंपाऊंड, संकरदा, जिल्हा बडोदा, गुजरात–३९१ ३५०, भारत।

ચેસ

પાયમેટ્રોજિન ૫૦% ડબ્લ્યુજી

જંતુનાશક

(માત્ર આયાત માટે)

પાયમેટ્રોજિન ૫૦% ડબ્લ્યુજી આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે અને તેની ભલામણ ડાંગરના પાકમાં થતા કથ્થઈ તડતડિયાંના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. છંટકાવ દ્વારા સીધી જ પ્રભાવિત ન થઈ હોય તેવી પાનની જીવાતોનું પણ પાયમેટ્રોજિન ૫૦% ડબ્લ્યુજી દ્વારા નિયંત્રણ થાય છે. આ છંટકાવના સંપર્કમાં આવ્યા પછી જીવાતો ખોરાગવાનું બંધ કરીદે છે અને ધીમે ધીમે મરી જાય છે.

સંરચના	**માત્રા% (વ/વ)**
પાયમેટ્રોજિન સ.ઘ.	૫૦.૦૦
વેટિંગ અને ડિસ્પર્સિંગ ઘટકો:	
લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ સોલ્ટ	૧૦.૦૦
ડાયબ્યુટીલનાફથાલીન આઈસોમર્સનું મિશ્રણ સલ્ફોનિક એસિડ સોડીયમ સોલ્ટ	૫.૦૦
એન્ટિફોમિંગ એજન્ટ:	
પોલિડાયમથાઇલસિલોક્સેન	૦.૨૦
વાહકો:	
સોડિયમ સલ્ફેટ	૫..૦૦
યુરિયા, પોલિમર ફોર્મલડીહાઈડ સહિત	૧૦.૦૦
સિલિસિયમ ઑક્સાઇડ	ક્યૂ.એસ.
કુલ	**૧૦૦.૦૦**

વપરાશ અને ઉપયોગ માટેની ભલામણો: નીચે આપેલી ભલામણો અનુસાર ઉપયોગ કરવા પર પાયમેટ્રોજિન ૫૦% ડબ્લ્યુજી ડાંગરના પાકમાં થતા કથ્થઈ તડતડિયાંનું નિયંત્રણ કરે છે.

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી.)	પાણીમાં દ્રાવ્ય (લી.)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી પરચેનો અંતરાળ (દિવસોમાં)
ડાંગર	કથ્થઈ રંગના તડતડિયા	૧૫૦	૩૦૦	૫૦૦	૧૯

વપરાશ માટેના નિર્દેશો:
જંતુનાશકની જોઈતી માત્રા માપી લો અને થોડાં પાણીમાં ભેળવી દો, ત્યારબાદ ધીમે ધીમે બાકીનું પાણી ઉમેરીને દ્રાવણ તૈયાર કરો. પાક પર જીવાતો દેખાય ત્યારે નેપસેક સ્પ્રેયરની મદદથી છંટકાવ કરો અને જીવાતના ઉપદ્રવ અનુસાર આવશ્યક જણાય તો ફરી વાર કરો. શરૂઆતમાં જીવાતના ઉપદ્રવ સમયે પહેલો છંટકાવ શરૂ કરીને ઇકોનોમિક થ્રેશોલ્ડ લેવલ (ઈટીએલ) સુધી પહોંચવામાં વધુમાં વધુ બે છંટકાવ કરી શકાય છે.

સંગ્રહ:
૧. જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને તેના મૂળ પાત્રમાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરવા વપરાતી અલગ રૂમ કે સ્ટોરમાં રાખવાં જોઈએ અથવા અલગ કબાટમાં તાળું લાવી મારીને રાખવા જોઈએ.
૨. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી અથવા જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, પૂરતા ઘના ઉજાસ ધરાવતી અને વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષણ ન થાય.

સાવચેતીઓ: છંટકાવ માટેનું દ્રાવણ તૈયાર કરવા સ્ટોઈના વાસણોનો ઉપયોગ ન કરો. છંટકાવનું દ્રાવણ હલાવવા લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખો અને કપડાં સાથે સંપર્ક થતો ટાળવા હાથમોજાં પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે સંરક્ષાત્મક કપડાં, મુખવટો, ગોગલ્સ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે ખાવો, પીશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. કાર્ય પૂરું થયા પછી હાથને સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલી લો. જંતુનાશક દ્વારા હવા અને જળાશોતોને પ્રદૂષિત થતા ટાળો. દૂષિત કપડાંનાં પણ ધોઈનાખો.

સાવચેતી: પાયમેટ્રોજિન ૫૦% ડબ્લ્યુજી ના પત્રિકામાં નિર્દિષ્ટ કર્યા સિવાયના અન્ય પાકો પર ઉપયોગ ન કરવું જોઇએ.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ:
૧. ખાલી પાત્રો અથવા વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને પાત્રોની સફાઈપ્રવાહણ અને જળપ્રદૂષણ ન થાય એમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઇએ.
૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતાં ન રાખવાં જોઇએ.
૩. ખાલી પાત્રોને તોડીને વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાંટી દેવા જોઇએ.

ઝેર ચઢવાના લક્ષણો:
વધુ માત્રામાં ગળી જવાય એ સિવાય તીવ્ર આંતરપ્રવાહી વિષક્રાકતાની સંભાવના નથી જણાતી. ઝેર ચઢવાના લક્ષણોમાં આંખ, ત્વચા અને શ્વસનમાર્ગમાં બળતરા થવી, હાઇપોએક્ટિવિટી, આંખ માંથી પાણી ઝરવું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, લાલ ઝાડા થવો, લાલ રંગનો પેશાબ થવો, ધ્રૂજારી થવી, શરીરનું તાપમાન ઘટવું, ચામડી લાલ થઈજવી ઈત્યાદિ સામેલ હોઈશકે છે.

પ્રાથમિક સારવિશ્રુષા:
પ્રભાવિત વિખ્યકતી જે ઘંઘી રૂવાં ધ્રાવ્યાવ ધ્રાં નાં ત્રાણી ધ્રાવ્યા રે ધ્રાપ્રવ નિકાલે અને ધુમ્રનું અંકારબુલિંગ તે ઘ્રાવ્યુ ! ઘ

Size: 504 mm x 280 mm

Chess®

PYMETROZINE 50% WG

INSECTICIDE

(For import only)

चेस

पाइमेट्रोज़िन ५०% डब्ल्यू.जी.

कीटनाशक

(केवल आयात के लिए)

syngenta®

Manufactured by :
Syngenta Korea Limited.
IKSAN Plant, 642 Seokam-Dong,
Iksan City, Jeonbuk Province
570-330, Korea.

Imported, repacked and marketed by:
Syngenta India Limited
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune - 411 045.
Maharashtra, India.

Factory address:
Plot No.1,
Swastik Ceramic compound,
Sankarda, Dist. Vadodara,
Gujarat-391350, India.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive.
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S.No. 110/11/3, Baner Road,
Pune-411045, Maharashtra, India
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310
Email:customercare.india@syngenta.com.

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करें.
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅरडीम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे-४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री: १८०० २००१ ३१०
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

IN4071928

ಚೆಸ್

ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ ೫೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

ಕೀಟನಾಶಕ

(ಕೇವಲ ಆಮದಾದಾನಿ ಪಾಲ್)

ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ ೫೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಣಜಿಕೆ ಆಗಿ ಸಾಕಲಿಗಾ ಕೀಟನಾಶಕ: ಎಲಾಲ್ಲು ಮಗಿ ಪಸಲೂದ ಪಾಯಿಶಿಯಾ ಬಿಡುವೆಯಿ ಕೊಡ ಸೆಯಿತ್ತು ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಮೇಲೆ ಪಸಲೂದ ಪಾಯಿಶಿಯಾ ಬಿಡುವೆಯಿ ಕೊಡ ಸೆಯಿತ್ತು ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೂತ್ರವು ಸಂರಚಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೀಟನಾಶಕ ತಿಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಸಾಯುವುದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ	ಉಪಯೋಗಪಡುವಿಕೆ %(ಕಿಲ್ಲೊ/ಕಿಲ್ಲೊ)
ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ ಎ.ಐ.	೫೦.೦೦
ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಪಡಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವನ್ನುವಿಕೆ:	
ಪೈಕ್ರೋಸಾಲಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಾ ಸಾಲ್ಟ್	೧೦.೦೦
ಕಾಲ್ಕುವಿನಾಲ್ಫಾಟಿಲೀನ್, ಪಸಲೂದಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಹಿತ ಪಾಲಿಯಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	೩.೦೦
ಎಸ್ಟರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಿಗಳು (ಎಸ್ಟರ್ಗಳು):	
ಪೈಕ್ರೋಸಾಲಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಾ ಸಾಲ್ಟ್	೦.೨೦
ಕಾರಿಯಾಸ್:	
ಸೋಡಿಯಾ ಸಾಲ್ಟೇಟ್	೩.೦೦
ಇಸಿಕಿಯಾ, ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಹಿಡಿದ ಸಾಥೆ ಪಲಿಮಾರ	೨.೦೦
ಸಿಲಿಸಿಕ್ಯಾ ಅಕ್ಸಾಇಡ್	ಕಿಟ್ರಿ.ಎಸ
ಮೊಟ	**೨೦೦%**

ಪ್ರಯೋಗ ಬಾವಹಿ ಮತ್ತು ಬಾವಹಿರದ ಜನ್ಯ ಸೂಪಾರಿ: ನಿಗಡೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿರ್ದೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಯಲ ಬಾವಹಿರ ಕಾಲ ಕಳೆ ಪೈಕಿಲಿಯಾಗಿ ೫೦% ಡ್ಬಲ್ಯೂ ಜಿಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಪಾಲಿಯ ಕೀಟ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಯಲ ಬಾವಹಿರ ಕಾಲ ಕಳೆ ಪೈಕಿಲಿಯಾಗಿ ೫