Size : 275 x 267 mm

Destal® Xtra

Mesotrione 2.27% w/w + Atrazine 22.7% w/w SC
[Mesotrione 2.5% w/v + Atrazine 25% w/v (275 g/l SC)]
(Selective Herbicide for Agricultural use)

Before applying the product, follow the instructions given on the label and leaflet.
Mesotrione 2.27% w/w + Atrazine 22.7% w/w SC is a selective post emergence herbicide recommended for the control of Grasses, Broad leaf weeds and Sedges in Maize and Sugarcane.

Composition: **Contents % w/w**
Mesotrione a.i. 2.27
Atrazine a.i. 22.7
Dispersing Agent: Acrylic graft copolymer solution 1.82
Isotridecanol-8-ethoxylate 1.82
Antifreeze: 1,2-Propanediol 4.55
Thickener: Xanthan gum 0.14
Attapulgite clay 0.9
Preservative: 1,2 benzisothiazol-3-one (as a 20% solution) 0.18
Antifoam agent: Polydimethylsiloxane 0.43
Buffers: Citric acid 0.91
Phosphoric acid solution 1.0
Stabilizing agent: Tetrasodium diphosphate 0.03
Adjuvant: Aqueous solution of D-glucopyranose oligomeric C_8-C_{10} alkylglycosides 18.18
Solvent: Water Q.S.
Total **100**
Density - 1.100 g/ml at 20°C.

Application and recommendation for use:
Mesotrione 2.27% w/w + Atrazine 22.7% w/w SC is recommended as selective post emergence herbicide for the control of following weeds in Maize and Sugarcane crops:

Crop	Common name of the weeds		Dosage/ha (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Litre/ hectare)	Number of applications & Time	Waiting period from last application to harvest (in days)
Maize	*Trianthema spp.*	*Cyperus spp.*	875	3500	500	Post emergence single spray application at 3-4 leaf stage of actively growing weeds	42
	Digitaria sanguinalis	*Echinochloa spp.*					
	Dactyloctenium aegyptium						
Sugar-cane	*Trianthema spp.*	*Amaranthus viridis*	875	3500	500		190
	Echinochloa colona	*Digitaria sanguinalis*					
	Cyperus rotundus	*Dactyloctenium aegyptium*					

Good practices relating to pesticide application techniques covering the following:
(i) **Weather conditions in general:** Do not spray during the windy weather conditions or during hot hours of the day, if the foliage is wet or if rain is imminent. Spray strictly with the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. Do not overdose by overlapping applications or by exceeding the recommended rate.
(ii) **Soil and Water:** This product should be applied during optimum sufficient soil moisture conditions. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas viz. ponds, ditches, lakes, drainage systems, etc, by disposal of product waste and do not allow direct over spray or spray drift.of product on to these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment.
(iii) **Crops stage for application:** Spray the recommended dose of the herbicide as post emergence single spray application at 3-4 leaf stage of actively growing weeds by using sufficient quantity of water to ensure through coverage of the weed foliage
(iv) **Application techniques:** Spray the recommended dose of the herbicide as post emergence single spray application at 3-4 leaf stage of actively growing weeds by using sufficient quantity of water to ensure through coverage of the weed foliage with the help of knapsack or any other suitable sprayer fitted with flat fan or flood jet deflector nozzle
(v) **Equipment type:** Spray with knapsack or any other suitable sprayer.
(vi) **Nozzle type:** Flat fan or flood jet deflector nozzle
(vii) **Dosage:** Given in the table above
(viii) **Instructions for mixing:** Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and apply by a suitable sprayer.
(ix) **Optimal Re-entry period:** Do not enter treated areas for 24 hours after each spray.
(x) **Pre-Harvest interval:** Given in the table above
(xi) **Application timings:** Apply as post emergence single spray application at 3-4 leaf stage of actively growing weeds.
(xii) **Frequency including maximum number of sprays:** Apply as post emergence single spray application at 3-4 leaf stage of actively growing weeds. Maximum no. of applications is one.

Resistance Management:
Group 27 5 Herbicide
This herbicides is an excellent resistance management tool as the two active ingredients have different modes of action. Do not continuously use same herbicide (of same mode of action) in same/next crop season and whenever required, prefer the spray of approved herbicide with different mode of action to avoid development of resistant weeds.
1. HRAC Group code: 27 (Mesotrione) and 5 (Atrazine)
2. Chemical class & Mode of Action: Mesotrione (Triketone) inhibits 4-HPPD and Atrazine (Triazine) inhibits photosynthesis.

Storage:
1. The packages containing the herbicide should be tightly closed, stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shelf be kept in separate almirahs under lock and key, away from children, unauthorized persons and animals.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Keep away from direct sunlight.
3. Do not allow product to freeze.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use wooden stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye, mouth and clothing. Avoid inhalation of fog, vapors or spray mist. Wear protective clothing (full sleeve shirt and pants), chemical resistant hand gloves to avoid contact with the skin, mask, goggles, hat and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. Also wash the contaminated clothes before re-use. Newly treated areas must not be grazed and all livestock is to be kept out until the treated area is dry. This product should not be applied (tank – mix) with any other chemical. Do not blow nozzle with mouth. Do not spray crops under stress. If any indisposition occurs, stop the work, follow first aid measures and call a physician immediately. Spilt product must not be re-used. Collect up split material properly and dry it in a safe place. Rinse spilt area with plenty of water. It is dangerous to re-use empty containers. Rinse empty container three times before disposal and add the rinsate into spray tank before application. Do not re-use empty container to keep food items or for any either purpose.
Precaution about succeeding crops:
Recommended Crop rotation with Maize: This mixture herbicide is recommended in maize-rapeseed mustard/maize- wheat/maize-barley crop rotations.
Recommended Crop rotation with sugarcane: This mixture herbicide is recommended in sugarcane- black gram / sugarcane-moong bean / sugarcane-mustard crop rotations.
Cautionery statements :
1. **Not to be used for any purpose other than those subscribed on labels & leaflets.**
2. **Product is highly toxic to Fish and aquatic organisms, its use may be avoided near aquaculture.**
3. **The product is skin sensitizer, prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions.**

Disposal of used packages/containers, surplus material :
1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to present their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning: Irritation to eyes, skin and respiratory tract may occur, product is skin sensitizer so it may cause skin allergy and other non-specific symptoms may be expected as labored respiration, nausea, vomiting, diarrhea, headache and confusion, lethargy, tremors.
First Aid: If poisoning or any indisposition is suspected. Stop work immediately and call a physician. Show label to the physician. Remove the affected person from danger zone to a well ventilated room or to fresh air.
If Ingested: Never give anything by mouth to an unconscious patient and never induce vomiting. Consult the doctor immediately.
If Inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.
In case of skin contact: Affected parts of body e.g. finger, nails, etc should be washed with soap and water. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. If skin irritation persists, consult a doctor.
In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.
Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatic therapy.
The user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufacturer's control.

डेस्टल एक्स्ट्रा

मेसोट्रिओन २.२७% डब्ल्यू/डब्ल्यू + एट्राझीन २२.७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी
[मेसोट्रिओन २.५% डब्ल्यू/व्ही + एट्राझीन २५% डब्ल्यू/व्ही (२७५ ग्रा./ली एससी)]
(तणनाशक वापरण्यासाठी - केवळ कृषि मे उपयोग हेतु)

उत्पादनात ते पुसण्यास, अनुदेशों को लेबल अथवा साथ दिये गये पत्रे में पढ़ें।
मिलाट्रिझन २.२७% मार/भार+एट्राजीन २२.७% मार/भार एस सी. एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल गन्ना एवं मक्का फसलों में घास कुलवाले, चौड़ी पत्ती वाले जाती के खरपतवार एवं मोथा के नियंत्रण हेतु खरपतवार उगने के बाद किया जाता है।

संघटन : **मात्रा % मार/भार**
मिलाट्रिझन स.त. २.२७
एट्राजीन स.त. २२.७
विसरनीयता तेलय : एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपोलिमर का घोल १.८२
इसोट्राईडेकनॉल-८ ऑक्सीलेट १.८२
एंटीफ्रीज : १, २-प्रोपेनडियोल ४.५५
गाढ़ीकर कारी तत्व: झन्थम गम ०.१४
अटापुल्गाईट क्ले ०.९
प्रीजरवेटीव : १,२-बैन्जिसोथियाजोल-३-वन (२०% का घोल) ०.१८
एंटिफोमिंग एजेंट: पोलीडाएमिथाइल सिलोक्सेन ०.४३
बफरस : सिट्रिक एसिड ०.९१
फास्फोरिक एसिड का घोल १.०
स्टेबिलिटिंग एजेंट : टेट्रासोडियम डाईफॉस्फेट ०.०३
अन्य घटक : डी-ग्लुकोपायरानोसी ओलिगोमेरिक सी.-सी.. अलकायलग्लाइकोसाडेस १८.१८
घुलाने वाले तत्व: पानी पर्याप्त मात्रा
कुल **१००**
घनत्व - १.१०० g/ml at 20°C.

इस्तेमाल का तरीकाऔर सिफारिश : मिलाट्रिझन २.२७% मार/भार + एट्राजीन २२.७% मार/भार एस.सी. का इस्तेमाल मक्का एवं गन्ना में एक चुनिंदा खरपतवारनाशक के तौर पर निम्नलिखित खरपतवारों के उगने के बाद किया जाता है।

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम		मात्रा प्रति हेक्टेयर		पानी की मात्रा: छिड़काव यंत्रित और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)	
			ग्रा. (स.त.)	मिली (वि.ति.)	लीटर/ हेक्टेयर	
मक्का	*इटलीट*	*(ट्रायएन्था सोलीडा),*	८७५	३५००	५००	खरपतवारों के उगने के बाद ३-४ पानी की सक्रिय गन्ना उगने की अवस्था में छिड़काव करें
	साईपरस रोटन्डस, बनया घास (डिजिटेरिया सैन्गुनालिस), सांवा (एकिनोक्लोआ स्पीसीज),					
गन्ना	*इटलीट*	*(ट्रायएन्था सोलीडा),*	८७५	३५००	५००	
	घरनई / अमरबेल विरिडिस, सांवा (एकिनोक्लोआ कोलोना), बनया घास (डिजिटेरिया सैन्गुनालिस), बड़ा लाल घोंघा (साइपरस रोटन्डस), चमकदार घास (डाक्टीलेक्टेनियम एजिप्टियम)					

खरपतवारनाशक छिड़काव संबंधी कार्यकुशल तकनीकी का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:
१. **मौसम की सामान्य परिस्थितियाँ :** तेज हवा के मौसम की स्थिति के दौरान या दिन के गर्म समय के दौरान स्प्रे न करें, यदि पत्ते गीले हैं या यदि बारिश आसन्न है तो छिड़काव ना करें। छिड़काव की कमी के बहुत ज्यादा अथवा बार बार संपर्क में आने से बचने के लिये हवा की दिशा में छिड़काव करें। अनुशंसित दर से कम अथवा अधिक होने पर जल-प्रदर्शनि और अन्य जलस्रोतिय इलाकों के आस पे जाकर अनुशंसित मात्रा से ज्यादा मात्रा में ना जाने दें।
२. **मिट्टी एवं पानी:** इस खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते समय मिट्टी में अच्छी पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सिंचाई या घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को दूषित न करें और पानी के क्षेत्र जैसे कि कहने वाले या स्थिर पानी, तालाब, खाई, झील, जल निकासी व्यवस्था आदि, का उपयोग अपशिष्ट के निपटान से, अथवा सीधे स्प्रे या स्प्रे बहाव को इन क्षेत्रों में न करें।
३. **छिड़काव के लिए फसल की अवस्था:** खरपतवारों के ३–४ पत्ती की सक्रिय बन रहे उगने की अवस्था होने पर इस खरपतवारनाशक की अनुशंसित मात्रा को निर्दिष्ट पानी में घोल बनाकर खरपतवारों की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव केवल एक बार करें और सुनिश्चित करें की की खरपतवारनाशक से खरपतवार की पत्तियां अच्छी तरह भीग गई हैं।
४. **छिड़काव की तकनीक:** खरपतवारों के ३–४ पत्ती की सक्रिय बन रहे उगने की अवस्था होने पर इस खरपतवारनाशक की अनुशंसित मात्रा को निर्दिष्ट पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल अथवा फ्लड जेट डिफ्लेक्टर नोजल लगे नैपसैक स्प्रेयर अथवा अन्य उपयुक्त स्प्रेयर से खरपतवारों की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव कर बार करें और सुनिश्चित करें की की खरपतवारनाशक से खरपतवार की पत्तियां अच्छी तरह भीग गई हैं।
५. **उपकरण के प्रकार:** नैपसैक स्प्रेयर अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्प्रेयर से छिड़काव करें
६. **नोजल का प्रकार:** फ्लैट फैन अथवा फ्लड जेट डिफ्लेक्टर नोजल
७. **मात्रा:** ऊपर टेबल में दी गयी है
८. **इस्तेमाल के लिए निर्देश :** उपचार की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। पूरी तरह से सिंचाई के साथ निर्दिष्ट पानी की शेष मात्रा जोड़ें तथा किसी भी घोल स्प्रेयर से पूरी फसल में छिड़काव करें और उपचोग करते समय अच्छी तरह से हिलाएं इस का अनुशंसित दर से कम/अधिक उपचोग के प्रभाव पर ध्यान दें।
९. **उपयुक्त पुन: प्रवेश अंतराल:** स्प्रे के बाद २४ घंटों के लिए उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें
१०. **अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल:** ऊपर टेबल में दी गयी है
११. **छिड़काव का समय:** खरपतवारों के ३–४ पत्ती की सक्रिय बन रहे उगने की अवस्था होने पर केवल एक बार खरपतवारों की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव करें।
१२. **छिड़काव की आवृत्ति अधिकतम छिड़काव समेत:** खरपतवारों के ३–४ पत्ती की सक्रिय बन रहे उगने की अवस्था होने पर केवल एक बार खरपतवारों की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव करें। एक फसल चक्र (सीज़न) में अधिकतम एक छिड़काव करें।

प्रतिरोध प्रबन्धन:
ग्रुप २७ ५ खरपतवारनाशक
इस खरपतवारनाशक में दो अलग तरह से कार्य करने वाले सक्रिय तत्व होने की वजह से ये प्रतिरोध प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। एक ही तरीके से काम करने वाले खरपतवारनाशकों के लगातार प्रयोग होने से प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि हो सकती है अतः इसी प्रजाति के काम करनेवाले खरपतवारनाशकों को आगे फसल चक्र में लगातार इस्तेमाल न करें एवं जहाँ तक सम्भव हो इन फसल चक्र में अलग तरह से काम करनेवाला खरपतवारनाशक प्रयोग करें।
१. एच.आर.ए.सी. ग्रुप कोड: मिलट्रिझन (सय) एवं एट्राजीन (५)
२. रासायनिक समूह तथा कार्यविधि: मिलट्रिझन ट्रिकीटोन) ४- एचपीपीडी का बाधित करता है और एट्राजीन (ट्राइज़ीन) प्रकाश-संश्लेषण को बाधित करता है।

संग्रह :
१. खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को सलामत बंद किया जाना चाहिए, अलग कमरे या परिसर में मूल कंटेनरों में सहेजीं किया जाना चाहिए जो कि विशेष रूप से भोजन, पेय और पशु चारा की चीजों को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर और उन्हें अलग-अलग अलमारी में लॉक और कुंजी के तहत रखा जाना चाहिए और बच्चों, अनधिकृत व्यक्तियों और जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए।
२. खरपतवारनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखा, अच्छी तरह से प्रकाशित और हवादार और पाप के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम के साथ निर्मित होने चाहिए। नमीं, खुलीं लौ, सीधी धूप और नमी से दूर रखें।
३. उत्पाद को जमने न दें।

सुरक्षा हेतु सावधानियाँ:
घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख मुँह और कपड़ों को खरपतवारनाशक के संपर्क से बचाने तथा बचा हुआ छिड़काव की मात्रा /पुंहार को अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि पूरा (पूर्ण बाजू की कमीज़ और पैंट), हैट/टोपी, मास्क, गॉगल्स, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, बूट्स पहनकर ही काम करें। उत्पाद को संभालते समय, खाएं, पीएं या धूम्रपान करें। साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोएं और काम खत्म होने के बाद कपड़े बदलें। हवा एवं पानी की खरपतवारनाशक से दूषित होने से बचाएं। दूबारा इस्तेमाल से पहले दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के तुरंत बाद खेतों में जानवरों को चरने नहीं चाहिये और सभी पशुओं को तब तक दूर रखें। जब खरपतवारनाशक का इस्तेमाल अन्य किसी रसायन के साथ मिलाकर (टैंक मिक्स) नहीं करें। नोजल को मुँह से फूंक नहीं मारें। फसलों के तनाव में होने पर छिड़काव न करें। यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, तो काम रोक दें, प्राथमिक चिकित्सा उपायों को अपनाएं और तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। बाहर छलके हुए या गिरे हुए घोल को दूबारा इस्तेमाल न करें। छलके हुए पदार्थ को इकट्ठा करें एवं सुरक्षित जगह पर उसे सुखा लें। खाली कंटेनरों को तीन बार साफ़ करें और इस्तेमाल से पहले खाली डिब्बों को पानी से तीन बार धोएं और ऐसे धोल को छिड़काव से पहले स्प्रे टैंक में डाल दें। खाली डिब्बों को खाने का सामान रखने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दोबारा उपयोग न करें।

फसलचक्र (साथ में लगाये गयी फसलों) हेतु सावधानियां :
मक्का की फसल के बाद लगने वाली फसलों के लिए संस्तुति : ये खरपतवारनाशक मक्का के बाद सरसों/मक्का के बाद गेहूं/मक्का के बाद जौ के सस्यावर्तन (फसल चक्र) में प्रयोग किया जा सकता है।
गन्ने की फसल के बाद लगने वाली फसलों के लिए संस्तुति : ये खरपतवारनाशक गन्ने के बाद कलौ उड़द/गन्ने के बाद मूंग/गन्ने के बाद सरसों खरपतवार (फसल चक्र) में प्रयोग किया जा सकता है

चेतावनियाँ:
1. **इस खरपतवारनाशक का लेबल पर दिये हुए विवरण के अनुसार इस्तेमाल करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु इस्तेमाल नहीं करें।**
2. **यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए विषैला है, इसका उपयोग जलीय कृषि/ मत्स्य पालन के आस पास ना करें।**
3. **उपयाद त्वचा संवेदी है, लंबे समय तक या बार-बार त्वचा के संपर्क में आने से एलर्जी हो सकती है।**

इस्तेमाल किये पैकेज / डिब्बे, बचे हुए पदार्थ का निपटारा:
१. पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने के लिए, पैकेज या अतिरिक्त सामग्री और के धोने के सुरक्षित तरीके से निपटान का कर्तव्य कीटनाशकों के निर्माता, फार्मुलेटर और ऑपरेटरों का होगा।
२. उपयोग किए गए पैकेजों को उनका पुन: उपयोग रोकने के लिए बहार नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
३. इस्तेमाल के बाद, जैसा की बताया गया है, पैकेजों को तोड़ कर दफ़न किया जाना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण : आंखों, त्वचा और बलगम नलिका में जलन हो सकती है, उपचार लक्षण संवेदनशील है, इसलिए यह त्वचा एलर्जी का कारण हो सकता है और अन्य गैर- विशिष्ट लक्षणों को साथ लेने से सांसलेने में परेशानी, उल्टी, दस्त, सिरदर्द और चक्कर के रूप में अपेक्षित किया जा सकता है, सुस्ती, थरथरी।
प्राथमिक उपचार : यदि चिकित्सक के लक्षण एवं अवस्थाएं लगें, तुरंत काम छोड़कर चिकित्सक को बताएं एवं चिकित्सक को लेबल दिखाएं। प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं। **गिरल जाने पर :** बेहोशी की अवस्था में मुंह द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए तथा उल्टी करने की कोशिश न करें। तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। **सास द्वारा अन्दर जाने पर :** पीड़ित को खुली हवा में ले जाएं एवं शरीर का तापमान नियंत्रण करें। यदि पीड़ित को सांस लेने में परेशानी हो तो कृत्रिम श्वसन दें। **त्वचा द्वारा अन्दर जाने पर :** प्रभावित अंगों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। शरीर के प्रभावित हिस्सों को (खासकर बगलों और नाखूनों के नीचे) पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि त्वचा पर बेचैनी लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। **आँखों के दूषित होने पर :** अत्याधिक पानी से १५ मिनट तक साफ करें, यदि आँखों में लगें, जलन एवं दृष्टिदोष महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
विष प्रतिहार दवा: कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करें।
किसी भी तरह से नुकसान का जोखिम जो निर्माता के नियंत्रण से परे है, यदि होता है, तो यह उपयोगकर्ता के उठाना होगा

ડેસ્ટલ એક્સટ્રા

મેસોટ્રિઓન ૨.૨૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ + એટ્રાઝાઈન ૨૨.૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ એસસી
[મેસોટ્રિઓન ૨.૫% ડબલ્યુ/વી + એટ્રાઝાઈન ૨૫% ડબલ્યુ/વી (૨૭૫ ગ્રામ/લિ એસસી)]
(તૃણોત્સારણી નિવડક તણનાશક)

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં લેબલ અને પત્રિકા પરની સૂચનાઓ વાંચવી.
મેસોટ્રિઓન ૨.૨૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ + એટ્રાઝાઈન ૨૨.૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ એસસી મકાઈ અને શેરડીમાં ઘાસ, પહોળા પાનનાં નિંદામણો અને કાંસ (સેજ) માટે ભલામણ કરવામાં આવેલું નિવડક તણનાશક છે.

બંધારણ: **પ્રમાણ ટકા ડબ્લ્યુ / ડબ્લ્યુ**
મેસોટ્રિઓન સ.ઘ. ૨.૨૭
એટ્રાઝાઈન સ.ઘ. ૨૨.૭
વિખેરણારક ઘટક: એક્રેલિક ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર સોલ્યુશન ૧.૮૨
આઇસોટ્રાઇડેકેનોલ-૮-ઇથોક્સીલેટ ૧.૮૨
એન્ટિફ્રીઝ: ૧,૨-પ્રોપેનડિઓલ ૪.૫૫
ચિકાશ: ઝેન્થન ગમ ૦.૧૪
એટાપુલ્ગાઇટ ક્લે ૦.૯
પ્રીઝર્વેટિવ: ૧,૨ બેન્ઝિસોથિયાઝોલ-૩-ઓન (૨૦% (વિ/વિ જલીય દ્રાવણ) ૦.૧૮
ફીણરોધી એજન્ટ: પોલીડાયમિથાઇલ સિલોક્સેન ૦.૪૩
બફર્સ: સાઇટ્રિક એસિડ ૦.૯૧
ફોસ્ફોરિક એસિડ દ્રાવણ ૧.૦
સ્થાયીકારક ઘટક: ટેટ્રાસોડિયમ ડાઇફૉસ્ફેટ ૦.૦૩
અન્ય ઘટક : ડી-ગ્લુકોપાયરાનોસ ઓલિગોમેરિક સી.-સી.. અલ્કાયલગ્લાયકોસાઇડ્સ ૧૮.૧૮
દ્રાવક: પાણી પર્યાપ્ત
કુલ **૧૦૦**
ઘનતા - ૧.૧૦૦ g/ml at 20°C.

ભલામણ અને ઉપયોગ માટેની જાણકારી:
મકાઈ અને શેરડીના પાકમાં નીચે જણાવેલાં નિંદામણો પર નિર્યંત્રણ કરવા માટે એકરૂપ પછી ઊગતી નિંદામણનાશક તરીકે મેસોટ્રિઓન ૨.૨૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ (વ/વ) + એટ્રાઝાઈન ૨૨.૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ (વ/વ)નાંસણીનો ભલામણ કરવામાં આવે છે:

પાક	નિંદામણનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીમાં ઉપયોગ કરવાની છંટકાવયંત્રથી	છેલ્લા પિયત અને કાપણી વચ્ચે રાખવાનો સમયગાળો (દિવસ)
		સ.ઘ. ગ્રામ (ગ્રામ)	વેચાણ મિલિલિટર (મિલી)	મિશ્રણ કરવાની (લીટર/ હેક્ટર)	
મકાઈ	*ટ્રાયન્થેમા પોર્ટ્યુલેકેસ્ટ્રમ, ડાયજેરા આર્વેન્સિસ, ડિજિટેરિયા સાન્ગ્વિનાલિસ, ઇચિનોક્લોઆ કોલોના, ટ્રેક્ટેલોક્ટેનિયમ એજિપ્ટિયમ*	૮૭૫	૩૫૦૦	૫૦૦	પાકમાં ઉગતા નિંદામણના ૩-૪ પાનના તબક્કા પર એકરૂપ પછી
શેરડી	*ટ્રાયન્થેમા પોર્ટ્યુલેકેસ્ટ્રમ, એમરન્થસ વિરિડિસ, ડિજિટેરિયા સાન્ગ્વિનાલિસ, સાયપરસ રોટન્ડસ, ટ્રેક્ટેલોક્ટેનિયમ એજિપ્ટિયમ*	૮૭૫	૩૫૦૦	૫૦૦	૧૯૦

જંતુનાશકો ઉપયોગની પદ્ધતિઓથી સંબંધિત સારી રીતોમાં નીચે જણાવેલી બાબતો આવરી લેવાય છે:
૧. **સામાન્યતયા હવામાન :** પાનથી ઓલસર અસેલ કિંવા પાકલ ગેણ્યાથી સ્રુપ જાસ્ત શવ્યતા અસલ્યાસ ગોરાયે ધારે વાહતાના કિંવા વિરવસપાત સ્રુપ ડાકાહ હોત અસેલ ત્યાબેલી પવારાળી કક્ષ નવહા. વાયવ વેહેવરાત વે વાશ્વાર પવારાતીલ તુષાર ગ્રેનાર પડ્યુ નવેહા નમ્પુલ વાત્યાવા દિશેનેય પવારાતી કરા. લીન પવારાણયે સરનિસ્કલ કક્ષન કિંવા વિશારત કેલેલ્યા ડોસયેહા ડાકિયે ડોસન ડાકિલક કક્ષન નવહા.
૨. **માતી વે પાણી :** માતીમ સંતોષ્લ્યાને પર્યાપ્યાને આર્દ્રતા હોને એવે પેરિસ્થિતિ દરમિયાન આ ઉપાદનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉપાદનના નકામા પાત્રોને કે ધોવાના પાણીને દૂષિત ના કરો એ રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉપાદનના નકામા પાત્રો અને ધોવાના પાણીનો નિકાલ કરીને જળાશયો, જેમ કે, કૂવા, ખાડા, તળાવો, ખાઈ, ઝીલ, જલ નિકાસી વ્યવસ્થા વગેરે જેવા વિસ્તારોમાં ઉપાદનને દૂષિત કરવા નહીં. આ વિસ્તારો પર સીધો છંટકાવ કે છંટકાવનો ફેલાવો ન થાય તે જોવું જોઈએ જેથી જળચર પ્રાણીઓ પર લાંબા ગાળાની પ્રતિકૂળ અસર ન થાય.
૩. **પાક માટે પાકનો તબક્કો:** નિંદામણનાં પોંદડાંને ખરાબર આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરવા પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કરીને સક્રિયપણે ઉગતા નિંદામણના ૩–૪ પાનના તબક્કા પર એકરૂપ પછી ઊગતી નિંદામણનાશકની ભલામણ કરેલી માત્રાનો છંટકાવ કરો.
૪. **ઉપયોગની પદ્ધતિઓ:** મેસોટ્રિઓન ૨.૨૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ + એટ્રાઝાઈન ૨૨.૭% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ (વ/વ) એસસીની ભલામણ કરેલી માત્રાનો પોંદડાંને ખરાબર આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરવા પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કરીને સક્રિયપણે ઉગતા નિંદામણના ૩–૪ પાનના તબક્કા પર એકરૂપ પછી ઊગતી નિંદામણનાશકની ભલામણ કરેલી માત્રાનો છંટકાવ કરો.
૫. **સાધનનો પ્રકાર:** નૅપસૅક કે કોઈ અન્ય ઉપયુક્ત કમ્પ્રેશરી છંટકાવ કરો
૬. **નોઝલનો પ્રકાર:** ફ્લેટ ફૅન કે ફ્લડ જેટ ડિફ્લેક્ટર નોઝલ
૭. **માત્રા:** ઉપર કોષ્ટકમાં આપેલું છે
૮. **મિશ્રણ કરવાની સૂચના :** જરૂરી પ્રમાણમાં ઉપાદનને થોડી માત્રામાં પાણીમાં ઓગાળો અને પાણીની બાકીની માત્રા સાથે એનું મિશ્રણ કરો. ખરાબર હલાવવાનો સાથે જરૂરવાળા મુજબ બાકીની પાણીની માત્રા ઉમેરો. હૅક્ટરને આવરી લેવા માટે જરૂરી પાણીમાં ઉપાદનની માત્રાનો ગોઠવણી કરો અને યોગ્ય છંટકાવયંત્રથી છંટકાવ કરો.
૯. **ઉપયાદ પુનર્પ્રવેશના કાલાવધિ :** પ્રત્યેક પવારણીનંતર ૨૪ તાસખર સ્પ્રા લેતાલ ફિરલુ નહા.
૧૦. **ફાંગામ અગાઉ૨ના કાલાવધિ :** વરીત ટેબલનાએ દિલા આજે
૧૧. **પવારણીની રીત :** તણ ઉગવલ્યાનંતર તે સક્રિયપણે વાઢાત અસતાના ૩–૪ પાનાંએ ફાંગામ્યાર ઉપર પવારણી કરવાવી.
૧૨. **કમાલ પવારણીસ્ર પવારણીથી વારંવારતા :** તણ ઉગવલ્યાનંતર તે સક્રિયપણે વાઢાત અસતાના ૩–૪ પાનાંથે ફાંગામ્યાર ઉપર પવારણી કરવાવી. ડાસ્તીત ડાસ્ત ૧ પવારણી કરવી.

દાન ને ઇષ્યાયન ડપાય :
ગ્રુપ ૨૭ ૫ તણનાશક
દોન સક્રિય ઘટકોથી વેગવેગથી ક્રતીપ્રકટ અસલ્યાસ હે તણનાશક દાન ને ઇષ્યાયન ઉસન ડપાય આલે. ત્યાય વિકાસ / પુરીપ વિકાસ ફંગામાત આળવક અસલ્યાયટ હે તણનાશક સાતલ્યને પવારક નહા. તત્ર ડાસ ન વિકાસ હોને નહી ન્યમૂન વેગથી ક્રતીપ્રકટ અસલ્યોને તણનાશક પ્રતિરોધક વિકાસ રે બચાવ કરી. નિંદામણો પ્રતિરોધકતા વિકસિત ન થાય એ માટે અસલ્યની અલગ રીતની ક્રાયવિધિ ધરાવતા મેસ્ટ્રીઓન અને ટેરબ્યુથાયલ નિંદામણનાશકનો ઉપયોગ પર્યાયક કરો.
૧. એચઆરઈઓની સમૂહ કોડ: ૨૭ (મેસોટ્રિઓન) અાણિ ૫ (એટ્રાઝાઈન)
૨. રાસાયનિક વર્ગ અને ક્રાયવિધિ: મેસોટ્રિઓન (ટ્રાયકેટોન) એ ૪-એચપીપીડી પ્રતિબંધક તરીકે કાર્ય કરે એટ્રાઝાઈન (ટ્રાયાઝાઈન) પ્રકાશ સંશ્લેષણ પ્રતિબંધક કરે.

સાતવૂન ડરવેને :
૧. હે તણનાશક અસલેલે પાકિટ પાક બંદ કક્ષન, મૂળ ડબ્યાત એવા લેબલ્યા ચોલીલ કિંવા ક્રાણનારી સાચવવાવાં કિંવા ફાન સાપુરી ડેવ્યાવાલી અસલેલ્યા ચોલીપાસૂન વેગ્યા ઠિકાણી, પૂરે, અનાધિકૃત વ્યક્તિ ન પુગ-ઢોરાંપાસૂન લાંબ એવા લેવ્યા નુકસૂચક ડાવાદાર દેવાવે.
૨. હે તણનાશક ડેવ્યાવાલી અસલેલી વાલી પવવ્યા બાંધકામાથી, કોરડી, પવપ્ર ડેઉક અસલેલી વ હવેશીર અસાવી, ડોકેકલન માખીબનવારૂને હવા દુષિત હોણાર નાહી. થેર વ

Size : 275 x 267 mm

ಡೆಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ

ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% w/w + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% w/w SC
[ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.5% w/v + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 25% w/v
(275 ಗ್ರಾ/ಲೀ. SC)]
(ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಹಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ (ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೇರಿರಬಹುದು) ಇರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟಕಗಳು	% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು
ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	2.27
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	22.7
ವಿಷಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು	1.82
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್	1.82
ಮೆಥೈಲೇಟೆಡ್ ನಾನ್-ಐಯೋನಿಕ್ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್	4.55
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ	0.14
ಆಮ್ಲೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.9
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಫೋಮರ್	0.18
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	0.43
ಬಫರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	0.91
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	1.0
ಬೆಂಜಿಸೋಥಯಜೋಲಿನೋನ್ (20% ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ)	0.18
ಎಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.43
ಆಕ್ಟಾಮೈಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಟೆಟ್ರಾಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.91
ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ	1.0
ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	0.91
ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್	0.03
ಸಾಂದ್ರತೆ - 1.100 ಗ್ರಾ/ಮಿ.ಲೀ. 20°ಸಿ - ನಲ್ಲಿ	
ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ - ಯುಕ್ತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ	ಪ್ರಮಾಣ / ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯ
		ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ (ಎಫ್.ಪಿ.) ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಲ್.)	ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಯ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಕಬ್ಬು	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ:

1. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ (ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳು)
2. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
3. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು
4. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ
5. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ:

1. **ಕಾಲವನಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ:** ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಾಲವನಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
2. **ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ:** ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
3. **ಕಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ:** ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
4. **ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ:

1. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ (ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳು)
2. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
3. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು
4. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ
5. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು:

1. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ (ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳು)
2. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
3. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು
4. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ
5. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಕಾಲವನಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ
2. ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ
3. ಕಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
4. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ:

1. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
2. ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ
3. ಕಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
4. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ಗ್ರೂಪ್	27	5	ಕಳೆನಾಶಕ

ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಹಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ (ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೇರಿರಬಹುದು) ಇರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟಕಗಳು	% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು
ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	2.27
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	22.7
ವಿಷಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು	1.82
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್	1.82
ಮೆಥೈಲೇಟೆಡ್ ನಾನ್-ಐಯೋನಿಕ್ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್	4.55
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ	0.14
ಆಮ್ಲೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.9
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಫೋಮರ್	0.18
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	0.43
ಬಫರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	0.91
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	1.0
ಬೆಂಜಿಸೋಥಯಜೋಲಿನೋನ್ (20% ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ)	0.18
ಎಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.43
ಆಕ್ಟಾಮೈಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಟೆಟ್ರಾಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.91
ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ	1.0
ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	0.91
ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್	0.03
ಸಾಂದ್ರತೆ - 1.100 ಗ್ರಾ/ಮಿ.ಲೀ. 20°ಸಿ - ನಲ್ಲಿ	

ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ - ಯುಕ್ತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ	ಪ್ರಮಾಣ / ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯ
		ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ (ಎಫ್.ಪಿ.) ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಲ್.)	ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಯ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಕಬ್ಬು	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ:

1. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ (ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳು)
2. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
3. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು
4. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ
5. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಕಾಲವನಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ
2. ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ
3. ಕಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
4. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ:

1. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
2. ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ
3. ಕಳೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
4. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ಗ್ರೂಪ್	27	5	ಕಳೆನಾಶಕ

ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಹಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಪರೋಗಿಸಿದವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ (ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೇರಿರಬಹುದು) ಇರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟಕಗಳು	% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು
ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	2.27
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ	22.7
ವಿಷಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು	1.82
ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್	1.82
ಮೆಥೈಲೇಟೆಡ್ ನಾನ್-ಐಯೋನಿಕ್ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್	4.55
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ	0.14
ಆಮ್ಲೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.9
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಫೋಮರ್	0.18
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	0.43
ಬಫರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	0.91
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	1.0
ಬೆಂಜಿಸೋಥಯಜೋಲಿನೋನ್ (20% ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ)	0.18
ಎಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.43
ಆಕ್ಟಾಮೈಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಟೆಟ್ರಾಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.91
ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ	1.0
ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	0.91
ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್	0.03
ಸಾಂದ್ರತೆ - 1.100 ಗ್ರಾ/ಮಿ.ಲೀ. 20°ಸಿ - ನಲ್ಲಿ	

ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೆಸೊಟ್ರೈಯೋನ್ 2.27% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ್ಯಟ್ರಾಜ್ಯೈನ್ 22.7% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ - ಯುಕ್ತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ	ಪ್ರಮಾಣ / ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯ
		ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ (ಎಫ್.ಪಿ.) ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೀಟರ್ಸ್ (ಎಲ್.)	ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಯ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಕಬ್ಬು	ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳು	875	3500	500	ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ 3-4 ಪತ್ರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ:

1. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ (ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳು)
2. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
3. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು
4. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ
5. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಕ