Size : 275 x 267 mm | PANTONE 7489 C | Blue Lines are Folding Mark and Area : 39.286 mm x 66.75 mm

Topas®

PENCONAZOLE 10% EC

(Systemic Fungicide)

टोपास

पेनकोनाजोल १०% ई.सी.

(अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक)

ટોપાસ

પેનકોનાઝોલ ૧૦% ઈ.સી.

(અંતરપ્રવાહી ફફૂંદીનાશક)

Topas® PENCONAZOLE 10% EC (Systemic Fungicide)

Manufactured and Marketed by :
Syngenta India Pvt. Ltd.
(erstwhile Syngenta India Ltd.),
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune - 411 045,
Maharashtra, India.
Factory address :
Unit II, Plot No. B-155 / 1, G.I.D.C.
Estate, Ankleshwar, District: Bharuch,
Gujarat-393002, India.

निर्माता और विपणनकर्ता:
सिंजेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(भूतपूर्व सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड),
अमर पॅराडीग्म, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे – ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
फैक्टरी का पता :
यूनिट नं.II, प्लाट नं. बी–१५५/१,
जी.आई.डी.सी. इस्टेट, अँक्लेश्वर,जिला–भरूच,
गुजरात–३९३ ००२, भारत.

IN3082350

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive. Syngenta India Private Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road, Pune-411045, Maharashtra, India.
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310,
Email:customercare.india@syngenta.com,
Website: www.syngenta.com

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करे. सिन्जेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, अमर पॅराडीग्म, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री : १८०० २००१ ३१०,
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,
वेबसाईट : www.syngenta.com

TOPAS® 10 EC

PENCONAZOLE 10% EC

(Systemic Fungicide)

TOPAS 10 EC is a systemic fungicide with excellent action against powdery mildew and scab disease. It contains 100 gm penconazole (1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-n-pentyl]-1H-1,2,4 -triazole) per litre of emulsifiable concentrate (EC) formulation.

APPLICATION: TOPAS 10 EC is recommended for the control of following diseases in respective crops.

Crop	Common Name of the disease	Dosage / (ha) gai or %	Formulation (ml.)	Diluted in water (l)	Waiting period from last spray to harvest (in days)
1	2	3	4	5	6
GRAPES	Powdery mildew (Unicinula necator)	0.005% or 5 gm / 100 Lt water	50 ml/ 100 Lt water	Depending upon the require-ment	30
APPLE	Scab (Venturia inaeqalis)	0.005% or 5 gm / 100 Lt water	50 ml/ 100 Lt water	10 Lt water per tree	30
MANGO	Powdery mildew (Odium mangiferae)	0.005% or 5 gm / 100 Lt water	50 ml/ 100 Lt water	10 Lt water per tree	30
PULSES (Black-Gram Green-gram)	Powdery mildew (Erysiphe Polygoni)	0.005% or 5 gm / 100 Lt water	50ml/ 100 Lt water	500 Lt/ ha	30

COMPATIBILITY: TOPAS 10 EC is compatible with other commonly used fungicides, pesticides, herbicides and fertilizers in the respective crops. It is always advised to check compatibility locally.

TOXICITY: The acute oral LD_{50} to TOPAS 10 EC is 4099 mg/kg. The acute dermal LD_{50} to rat is > 3000 mg/kg. It is moderate to minimal irritant to the skin and eye of rabbits.

DIRECTIONS FOR USE: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.

STORAGE :

1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

PRECAUTIONS: Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution.

Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use.

Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc., by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc., in them.

Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

DISPOSAL OF CONTAINERS :

1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

POISONING SYMPTOMS AND TREATMENT: No case of human poisoning is on record. In laboratory studies, poisoning symptoms in rodents were non-specific.

FIRST AID: In case of contact with skin and eyes, wash immediately with plenty of water. If inhaled, move to clean air. If swallowed, give a large quantity of medical charcoal in plenty of water. Seek medical attention if a large volume of concentrate was ingested or if irritation persist.

ANTIDOTE: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

टोपास १०% ई.सी.

पेनकोनाजोल १०% ई.सी.

(अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक)

टोपास १०% ई.सी. यह एक अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक जो चूर्ण फफूंद और पामारोग जैसे रोगों को श्रेष्ठ कार्य से नियंत्रित करता है। इसमें १०० ग्राम पेनकोनाजोल (१ – (२ –, ४ – डायक्लोरोफिनाइल) – एन – पेन्टाईल) – १एच – १,२,४ – ट्रायाजोल प्रति लिटर का इमलसिफायबल कोनसेन्ट्रेट (ई.सी.) संरचना है।

प्रयोग : टोपास १०% ई.सी. यह नीचे दी गयी फसलों पर आने वाले रोगों की रोकथाम के लिये अनुमोदित है।

फसल	रोग का सामान्य नाम	सक्रिय तत्व ग्रा. या %	मात्रा प्रति हेक्टयर संरचना (मि.ली.)	पानी का मिश्रण मात्रा (ली.)	आखिरी छिड़काव व कटाई के बीच का अंतराल (दिन में)
१	२	३	४	५	६
अंगूर	चूर्ण फफूंद (युनिसिनुला नेकाटोर)	०.००५% या ५ ग्रा./ १०० ली. पानी	५० मिली./ १०० ली. पानी	आवश्यकता अनुसार	३०
सेब	पामारोग (वेनचुरीया इनेक्वालिस)	०.००५% या ५ ग्रा./ १०० ली. पानी	५० मिली./ १०० ली. पानी	१० ली. पानी प्रति पेड़	३०
आम	चूर्ण फफूंद (ओइडीयम मॉनगीफेरे)	०.००५% या ५ ग्रा./ १०० ली. पानी	५० मिली./ १०० ली. पानी	१० ली. पानी प्रति पेड़	३०
दाल (उडद / मूंग)	चूर्ण फफूंद (एरिसिफे पॉलीगॉन)	०.००५% या ५ ग्रा./ १००ली. पानी	५० मिली./ १०० ली. पानी	५०० ली./ हे.	३०

अनुरुपता : टोपास १०% ई.सी. को आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले अन्य फफूंद नाशके, कीटनाशकें, खरपतवार नाशकें और खादों के साथ मिलाया जा सकता है। और विशेष फसलों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सलाह दी जाती है कि अनुरुपता की स्थानीय रुप से जांच कर लें।

विषेलापन : चुहों के लिए तीव्र मौखिक एल. डी. $_{५०}$ टोपास १०% ई.सी. की ४०९९ मिग्रा./किग्रा. है। तीव्र त्वचा एल.डी. $_{५०}$ चुहों के लिए ३००० मिग्रा./किग्रा. है। इसे खरगोशों की त्वचा और आंखों के लिए हल्की सी परेशानी हो सकती है।

प्रयोग के लिए निर्देश : उत्पाद की वांछित मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। नैपसैक छिड़काव यंत्र तथा बड़ी मात्रा ताकि स्प्रेयर में आदि से बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए निर्देष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिला–हिलाकर मिला लीजिए।

संग्रहण :

१. फफूंदी नाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री, विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए प्रयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारियों में फफूंदीनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार रखना चाहिए।
२. फफूंदीनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सुखी, भलीभांति प्रकाशित व हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सकें।

सावधानियां : छिड़काव तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा से स्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, चश्मा, जूते आदि पहनें व स्वयं को छिड़काव की फुहार से बचें। नोजल्स में मुंह से फूंक न मारें। उत्पाद को उठाने, रखने या प्रयोग करने के समय खाना–पीना या धूम्रपान न करें। इस्तेमाल न किए गए छिड़काव घोल का संग्रहण न करें। प्रतिदिन प्रयोग के बाद छिड़काव यंत्रों, बाल्टियों व अन्य वर्तनों को पानी से अच्छीतरह धो लें।

कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढ़ेर सारे पानी से धोयें। बचे हुए छिड़काव सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदि में बहाकर या छिड़काव यंत्रों, बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उन को दूषित न करें।

यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो छिड़काव न करें। सिफारीश की गई मात्रा में प्रयोग किए जाने पर वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नही रहती है। यदि विष चढ़ने का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करें।

डिब्बों का निपटारा :

१. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल / पदार्थ, मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
२. उपयोग किए गए डिब्बें / पैकेटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
३. पैकेटों / डिब्बों को तोड़–फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

विष के लक्षण : अब तक किसी भी विष बाधा की घटनायें नही हुई है। प्रयोगशाला के परिक्षणो में चूहों पर कुछ विशेष विष बाधा के लक्षण दिखाई नही दिए।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि त्वचा और आंखों में लग जाए तो तुरन्त भरपूर पानी से धो डालें। अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो अच्छी, स्वच्छ हवा में लें जायें। अगर निगल लिया हो तो भरपूर पानी में मेडिकल चारकोल भरपूर मात्रा में दे। अगर अधिक मात्रा में निगला हो या तकलीफ ज्यादा देर तक रहे तो तुरन्त डाक्टरी उपाय करें।

विष नाशक : कोई विशेष विष नाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

टोपास १० ईसी

पेनकोनाझोल १०% ईसी

(अंत:प्रवाही बुरशीनाशक)

टोपास १० ईसी हे एक अंत:प्रवाही बुरशीनाशक आहे. भुरी व खपल्या रोगांवर ते अतिशय परीणामकारक आहे. फेसाळणाऱ्या तीव्र ईसी स्वरुपाच्या १ लीटर औषधामध्ये १०० ग्रॅम पेन्कोनाझोल (१-(२-(२, ४-डायक्लोरोफेनिल)-एन-पेन्टिल)-१एच-१,२,४-ट्रायाझोल) असते.

वापरण्यासाठी शिफारस : टोपास १० ईसी खाली दिलेल्या पिकांवरील त्यापुढे दर्शविलेल्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी वापरावे अशी शिफारस आहे.

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	सक्रीय घटक ग्रॅम किंवा %	दर हेक्टरी प्रमाण औषधाचे प्रमाण (मि.ली.)	मिश्रण-साठी पाण्याचे प्रमाण (ली.)	पीक अखेरची फवारणी व कापणी या मधील अंतर (दिवस)
१	२	३	४	५	६
अंगूर	भुरी (युनिसिन्यूला निर्केटर)	०.००५% किंवा ५ ग्रॅ./ १०० ली. पाणी	५० मिली./ १०० ली. पाणी	आवश्यकता अनुसार	३०
सफरचंद	खपल्या (व्हेन्चुरिया इनीक्वालिस)	०.००५% किंवा ५ ग्रॅ./ १०० ली. पाणी	५० मिली./ १०० ली. पाणी	१० ली. पाणी प्रति झाड	३०
आंबा	भुरी (ऑयडियम मॉंगिफेरी)	०.००५% किंवा ५ ग्रा./ १०० ली. पाणी	५० मि.ली./ १०० ली. पाणी	१० ली. प्रति झाड	३०
मूग डाळी उडीद	भुरी (एरीसीफे पॉलीगोनी)	०.००५% किंवा ५ ग्रा./ १०० ली. पाणी	५० मिली./ १०० ली.	५०० ली./ हे. पाणी	३०

मिश्रणक्षमता : नेहमीच्या वापरातील बुरशीनाशके, कीटकनाशके, तणनाशके आणि रासायनिक खते यांच्या बरोबरीने संबंधित पिकांसाठी टोपास १० ईसी वापरावयास सोयीस्कर आहे. परंतु स्थानिक गरजेनुसार ही सोयिस्करता चाचणी करुन पहावी असा सल्ला देण्यात येत आहे.

विषारीपणा : टोपास १० ईसीची उंदराच्या बाबतीत 'ॲक्यूट ओरल एल डी $_{५०}$' प्रती किलो ४०९९ मि.ग्रॅ आहे. आणि 'डर्मल एल डी $_{५०}$' प्रती किलो ३०००मि.ग्रॅ हून अधिक आहे. सशाच्या त्वचेच्या व डोळ्यांच्या बाबतीत साधारण ते अत्यंत कमी त्रासदायक आहे.

कसे वापरावे : बुरशी नाशकाची आवश्यक मात्रा मापून घ्या आणि थोड्याशा पाण्यात चांगली मिसळा. नंतर उरलेले आवश्यक पाणी थोडे थोडे त्यात घालून मिश्रण नीट ढवळा आणि नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा हाय व्हॉल्यूम स्प्रेयर मधून 'हाय व्हॉल्यूम' फवारणी करा.

साठवण :

१. ह्या बुरशीनाशकाची पाकिटे/ बाटल्या/ डबे/ खोली, इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या खोल्या किंवा जागांपासून दूर वेगळ्या जागी किंवा वेगळ्या कपाटात बुरशीनाशकाचा साठा व स्वरुप यावर अवलंबून कडीकुलूप लावून ठेवावी.
२. बुरशीनाशक साठवण्यासाठी वापरावयाच्या खोल्या किंवा जागा मजबूत बांधणीच्या, हवेशीर, उजेड व हवा खेळती आहे अश्या आणि वाफांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी पुरेश्या लांबरुंद असल्या पाहिजेत.

सावधानीच्या सूचना : फवारणीचे मिश्रण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. मिश्रण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. त्वचेला लागू नये यासाठी हातमोजे वापरा. शिवाय श्वासात ओढू नका, डोळ्यांना लागणार नाही अशी काळजी घ्या. फवारणी करतांना संरक्षक कपडे, मुखवटा, गॉगल, बूट वापरा. फवारा अंगावर उडणार नाही अशी दक्षता घ्या. तोटी तोंडाने फुंकु नका. हे उत्पादन हाताळताना किंवा वापरताना काही खाऊ-पिऊ नका आणि धूम्रपान करु नका. न वापरलेल्या फवारा मिश्रणाचा साठा ठेवू नका.

वापर केल्यानंतर स्प्रेयर, बादल्या आणि इतर भांडी रोज पाण्याने स्वच्छ धुवा. फवारणी संपल्यानंतर हातांना साबण लावून पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि कपडे बदला. प्रदूषित कपडेसुध्दा धुवा. शिल्लक राहिलेले फवाऱ्याचे मिश्रण नदीनाले, तळी, विहीरी इत्यादी मध्ये टाकून किंवा स्प्रेयर, बादल्या इत्यादी उपकरणे त्यामध्ये धुवून त्यांचे पाणी प्रदूषित करु नका.

मधमाश्या क्रियाशील असतील तेव्हा फवारु नका. शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापरल्यास वन्य प्राण्यांवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही. विषबाधेचे कोणतेही चिन्ह दिसल्यास ताबडतोब डॉक्टरचा सल्ला घ्या.

डबे/खोके इत्यादींची वासलात :

१. पर्यावरणाचे व पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी डबे व खोके किंवा उरलेले रसायन आणि यंत्रे व भांडी धुवून आलेले पाणी यांची वासलात सुरक्षितरित्या काळजीपूर्वक लावावी.
२. वापरुन झालेले डबे/खोके, त्यांचा पुन्हा वापर केला जाऊ नये यासाठी उघड्यावर टाकू नका.
३. डबे/खोके मोडून तोडून वस्तीपासून दूर पुरा.

विषबाधेची लक्षणे व उपचार : माणसांना विषबाधा झाल्याचे ऐकिवात नाही. प्रयोग शाळेतील चाचण्यांत उंदरांच्या बाबतीत विशिष्ट प्रकारची अशी विषबाधेची लक्षणे दिसली नाहीत.

प्रथमोपचार : त्वचेला व डोळ्यांना संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने ताबडतोब धुवा. श्वासातून ओढले गेल्यास, रोग्याला शुद्ध मोकळ्या हवेत न्या. पोटात गेल्यास भरपूर मण्यात औषधी चारकोल मोठ्या प्रमाणात मिसळून प्यावयास द्या. तीव्र स्वरुपाचे बुरशीनाशक जास्त प्रमाणात पोटात गेल्यास किंवा जळजळ होत राहिल्यास डॉक्टरला बोलवा.

विषनिवारक उपचार : विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

ટોપાઝ ૧૦ ઈ.સી.

પેન્કોનાઝોલ ૧૦% ઈ.સી.

(શોષક (સીસ્ટેમીક) પ્રકારનું ફુગનાશક)

ટોપાઝ ૧૦ ઈ.સી., શોષક (સીસ્ટેમીક) પ્રકારનું ફુગનાશક છે જે સફેદ છારા તથા સ્કેબ જેવા રોગોના નિયંત્રણ માટે અત્યંત અસરકારક છે. એક લીટર ઈ.સી. ફોર્મ્યુલેશનમાં ૧૦૦ ગ્રામ પેન્કોનાઝોલ (૧-(૨-(૨, ૪-ડાયક્લોરોફેનીલ)-એન-પેન્ટીલ)-૧એચ-૧,૨,૪-ટ્રાયાઝોલ) હોય છે.

ઉપયોગ: ટોપાઝ ૧૦ ઈસી નો ઉપયોગ જુદા જુદા પાકોમાં નીચે દર્શાવેલ રોગના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે.

પાક	રોગનું નામ	સક્રિય તત્વ ગ્રામમાં અથવા %	ભલામણ/હેક્ટર દીઠ દવાનું પ્રમાણ (મી.લી.)	પાણીમાં પ્રવાહી દ્રવ્ય (લીટરમાં)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો અંતરાળ (દિવસમાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬
દ્રાક્ષ	પાવડરી મીલ્ડ્યૂ (સફેદ છારો) (યુનીસીનુલા નેકેટર)	૦.૦૦૫% અથવા ૫ ગ્રામ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૫૦ મી.લી. ૧૦૦ લીટર	પાકની વૃધ્ધિ પ્રમાણે	૩૦
સફરજન	સ્કેબ (વેન્ટ્યુરા ઈનેક્વેલીસ)	૦.૦૦૫% અથવા ૫ ગ્રામ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૫૦ મી.લી. ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૧૦ લીટર પાણી ૧ ઝાડ દીઠ	૩૦
આંબા	પાવડરી મીલ્ડ્યૂ (સફેદ છારો) (ઓઈડીઅમ મેન્જીફેરી)	૦.૦૦૫% અથવા ૫ ગ્રામ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૫૦ મી.લી. ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૧૦ લીટર પાણી ૧ ઝાડ દીઠ	૩૦
કઠોળ નાપાક (અડદ, ચણા, મગ, મઠ વગેરે)	પાવડરી મીલ્ડ્યૂ (સફેદ છારો) (ઈરીસીફી પોલીગોની)	૦.૦૦૫% અથવા ૫ ગ્રામ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૫૦ મી.લી. ૧૦૦ લીટર પાણીમાં	૧૦૦ લીટર પાણી પ્રતિ હેક્ટર	૩૦

સુસંગતતા: ટોપાઝ ૧૦ ઈસી, જેતે પાકમાં સામાન્ય રીતે વપરાતાં અન્ય ફુગનાશકો, જંતુનાશકો, નિંદામણ નાશકો અને રાસાયણીક ખાતરો સાથે ભેળવીને છાંટી શકાય છે. સ્થાનિક પરિસ્થિતિમાં તેની સુસંગતતા ચકાસી લેવી હિતાવહ છે.

વિષમયતા: ટોપાઝ ૧૦ ઈસીની તીવ્ર મૌખીક એલ.ડી. $_{५०}$ વેલ્યુ ૪૦૯૯ મિ.ગ્રા. પ્રતિ ૧ કિલો છે. ઉંદર પર તીવ્ર ત્વચા એલ.ડી.$_{५०}$ વેલ્યુ ઉ ૩૦૦૦ મિ.ગ્રા./પ્રતિ કિલો છે. સસલાની ત્વચા અને આંખો ઉપર સામાન્યથી મધ્યમ સંવેદનશીલ છે.

વાપરવાની રીત: જરૂરી માત્રામાં દવા લઈ થોડા પાણી સાથે તેને બરોબર ભેળવો. હાઈવોલ્યુમ છંટકાવ માટે સ્ટીકરપંપથી છાંટવા, ભલામણ કરેલ પાણીનો જથ્થો ઉમેરી, બરોબરા હલાવી છંટકાવનું દ્રાવણ તૈયાર કરો.

સંગ્રહ:

૧. ફુગનાશક દવાની બોટલ, ખાસ કરીને ખોરાક સંગ્રહ કરવાની જગ્યાથી દુર, અલગ ઓરડામાં અથવા જગ્યાએ રાખો અથવા ફુગનાશક દવાની ઝેરી અસર મુજબ તેમજ જથ્થા ને ધ્યાનમાં રાખી અલગ જગ્યાએ તાળુ મારીને રાખો.
૨. ફુગનાશક દવા રાખવાનો ઓરડો અથવા જગ્યા, હવા ઉજાસવાળી તેમજ મોકળાશવાળી હોવી જરૂરી છે જેથી હવાનું પ્રદુષણ રોકી શકાય.

સાવચેતીના પગલાં: દવા છાંટવાનું દ્રાવણ બનાવવા માટે, ખોરાક રાંધવાના વાસણો ને ઉપયોગમાં ન લો અને દ્રાવણ બનાવતી વખતે લાકડી નો ઉપયોગ કરો. ચામડી સાથે સ્પર્શ ન થાય તે માટે હાથમોજા પહેરો. શ્વાસોચ્છવાસમાં ન આવે અને આંખો સાથે સંપર્કમાં ન આવે તેની કાળજી લો. દવા છાંટતી વખતે સુરક્ષા માટે અલગ કપડાં પહેરો, માઢે રૂમાલ બાંધો, ચશ્મા તેમજ બુટ પહેરો અને દવાનો છંટકાવ શરીર પર ન થાય તેની કાળજી લો. મોઢા વાટે ફુંક મારી નાંઝલ સાફ ન કરો. દવા છાંટતી વખતે ખાવું, પીવું કે ધુમ્રપાન ન કરો. વપરાયેલ દ્રાવણ ને રાખી ન મુકો.

દવા છાંટ્યા બાદ, પંપને, બાલ્ટીને અને અન્ય સાધનોને પાણીથી બરોબર ધોઈ નાખો. દવા છાંટ્યા બાદ, હાથપગ સાબુથી ખુબ પાણી લઈ બરોબર ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલો. છંટકાવ કરતી વખતે ઉપયોગમાં લીધેલ કપડાં ને ધોઈ નાખો. નદી, નાળા અથવા અન્ય પાણી ભરાયેલ જગ્યામાં વધેલ દવાનું દ્રાવણ ઢોળી, તેમાં પંપ બાલ્ટી કે અન્ય સાધનો સાફ કરી, પ્રદૂષિત ન કરો. મધમાખીઓ ક્રિયાશીલ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. ભલામણ કરેલ માત્રામાં વાપરવાથી વન્ય પ્રાણીઓ ઉપર કોઈ વિપરીત અસર થવાની સંભાવના નથી. દવાનું ઝેર ચઢ્યા ના લક્ષણો દેખાય તો તરત ડોક્ટરની સારવાર લો.

દવાની ખાલી બોટલ/પેકેજીંગનો નિકાલ:

૧. વાતાવરણ તથા પાણીનું પ્રદૂષણ નિવારવા, દવાના પેકિંગ અથવા બિન વપરાયેલ દવાનો જથ્થો તથા મશીન વગેરે સાફ કરતી વખતે પાણીનો વ્યવસ્થિત નિકાલ કરો.
૨. ફરી વખત વપરાશમાં ન આવે તે માટે, દવાના પેકિંગ વગેરે ગમે ત્યાં ન ફેંકો.
૩. વપરાયેલ દવાના પેકિંગ વિગેરેને તોડી નાખી, ખાડામાં દાટી દો.

ઝેર ચઢવાના લક્ષણો અને સારવાર: પ્રયોગશાળા ના અભ્યાસ દરમ્યાન, માણસો ઉપર ઝેર ચઢવાના કોઈ લક્ષણો જાણાયા નથી. ઉંદર ઉપર કોઈ ચોક્કસ ઝેર ચઢવાના લક્ષણો જાણાયા નથી.

પ્રાથમિક સારવાર: ચામડી અગર આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો તુરંત ખૂબ પાણી થી ધોઈ નાખો. શ્વાસોચ્છવાસમાં આવે તો ખુલ્લી હવામાં જાઓ. જો પેટમાં જાય તો, જરૂરી પાણી સાથે ખૂબ મેડીકલ ચારકોલ આપો. મોટા જથ્થા માં દવા પેટમાં જાય અગર ખૂબ બળતરા થાય તો તુરંત ડોક્ટરની સારવાર લો.

વિષમારણ: ચોક્કસ વિષમારણ જાણાયેલ નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર આપો.

ਟੋਪਾਸ ੧੦ ਈਸੀ

ਪੇਨਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੦% ਈਸੀ

(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫ਼ਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ)

ਟੋਪਾਸ ੧੦% ਈਸੀ ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫ਼ਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਤਾ ਜ਼ੋਰੂਏਂਦਾਰ ਫ਼ਫੂੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੈਬ (ਪਪੜੀ) ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ੧੦੦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੇਨਕੋਨਾਜ਼ੋਲ (੧-(੨-(੨-੪-ਡਾਈਕਲੋਰੋਫੇਨਾਈਲ)-ਐਨ-ਪੇਂਟਾਈਲ)-੧ ਐਚ-੧, ੨, ੪-ਟ੍ਰਾਯਾਜ਼ੋਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਏਬਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟ (ਈਸੀ) ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ: ਟੋਪਾਸ ੧੦% ਈਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਫ਼ਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਏ.ਆਈ. ਵ੍ਰ. (%)	ਪ੍ਰ.ਹੈ. ਮਾਤਰਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	ਅੰਤਿਮ ਸਪ੍ਰੇ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਦੇ (ਦਿਨ)
੧	੨	੩	੪	੫	੬
ਅੰਗੂਰ	ਚੂਰਣੀਦਾਰ ਫ਼ਫੂੰਦੀ (ਯੂਨੀਸੀਨੂਲਾ ਨੇਕਾਟੋਰ)	੦.੦੦੫% ਜਾਂ ੫ ਗ੍ਰਾ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੫੦ ਮਿ.ਲਿ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ	੩੦
ਸੇਬ	ਪਪੜੀ (ਵੇਂਤੂਰੀਆ ਇੰਨੀਕੁਆਲੀਸ)	੦.੦੦੫% ਜਾਂ ੫ ਗ੍ਰਾ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੫੦ ਮਿ.ਲਿ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਖ਼ਤ ੧੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੩੦
ਅੰਬ	ਚੂਰਣੀਦਾਰ ਫ਼ਫੂੰਦੀ (ਓਡੀਅਮ ਮੈਂਗੀਫ਼ੇਰੀ)	੦.੦੦੫% ਜਾਂ ੫ ਗ੍ਰਾ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੫੦ ਮਿ.ਲਿ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਖ਼ਤ ੧੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੩੦
ਦਾਲਾਂ (ਮੱਹ, ਮੂੰਗੀ)	ਚੂਰਣੀਦਾਰ ਫ਼ਫੂੰਦੀ (ਏਰੀਸਾਈਫ਼ ਪੋਲੀਗੋਨੀ)	੦.੦੦੫% ਜਾਂ ੫ ਗ੍ਰਾ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੫੦ ਮਿ.ਲਿ./ ੧੦੦ ਲਿ. ਪਾਣੀ	੫੦੦ ਲਿ./ ਦਵਾਈ	੩੦

ਮਿਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਟੋਪਾਸ ੧੦% ਈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ: ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਟੋਪਾਸ ੧੦% ਈਸੀ ਦੀ ਔਕਿਊਟ ਓਰਲ ਐਲਡੀ$_{५०}$ ਹੈ, ੪੦੯੯ ਮਿਗ੍ਰਾ./ਕਿਗ੍ਰਾ.। ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਔਕਿਊਟ ਡਰਮਲ ਐਲਡੀ$_{५०}$ ਹੈ, > ੩੦੦੦ ਮਿਗ੍ਰਾ./ਕਿਗ੍ਰਾ.। ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥ

Size : 275 x 267 mm

PANTONE 7489 C

Blue Lines are Folding Mark and Area : 39.286 mm x 66.75 mm

Topas®

PENCONAZOLE 10% EC

(Systemic Fungicide)

टोपास

पेनकोनाजोल १०% ई.सी.

(अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಟೊಪಾಸ್

ಪೆನ್‌ಕೊನಾಝೋಲ್ 10% EC

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

Topas®

PENCONAZOLE 10% EC

(Systemic Fungicide)

syngenta®

Manufactured and Marketed by :
Syngenta India Pvt. Ltd.
(erstwhile Syngenta India Ltd.),
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune - 411 045,
Maharashtra, India.
Factory address :
Unit II, Plot No. B-155 / 1, G.I.D.C.
Estate, Ankleshwar, District: Bharuch,
Gujarat-393002, India.

निर्माता और विपणनकर्ता:
सिंजेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(भूतपूर्व सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड),
अमर पॅराडीम, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे – ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
फैक्टरी का पता :
यूनिट नं.II, प्लाट नं. बी–१५५/१, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, अँक्लेश्वर,जिला–भरूच, गुजरात–३९३ ००२, भारत.

IN3082350

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive, Syngenta India Private Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road, Pune-411045, Maharashtra, India.
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310,
Email:customercare.india@syngenta.com,
Website: www.syngenta.com

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करे. सिन्जेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, अमर पॅराडीम, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री : १८०० २००१ ३१०,
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,
वेबसाईट : www.syngenta.com

ಟೊಪಾಸ್ 10 EC

ಪೆನ್‌ಕೊನಾಝೋಲ್ 10% EC

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

ಟೊಪಾಸ್ 10 EC, ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮೆಸಗುವ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪೆನ್‌ಕೊನಾಝೋಲ್ (1-(2-(2,4-ಡೈಕ್ಲೋರೋಫೆನಿಲ್)-ಎನ್-ಪೆಂಟಿಲ್)-1 ಎಚ್-1, 2, 4-ಟ್ರಿಯಾಝೋಲ್) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯೇಬಲ್ ಕಾಂಸಂಟ್ರೇಟ್ (EC) ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸೇರಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಗ: ಟೊಪಾಸ್ 10 EC, ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ %	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ಬೆರೆಸಬೇಕಾದ ನೀರು ಲೀ.	ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಯುಮಿನಿಮ್ಯುಲಾ ನೇಕೇಟರ್)	(0.005%) ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾ/100 ಲೀ. ನೀರು	50 ಮಿ.ಲೀ./ 100 ಲೀ. ನೀರು	ಅಮೃತಹಸ್ತ ಅಸುವಾರ	30
ಸೇಬು	ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ (ವೆಂಚುರಿಯಾ ಇನೆಕ್ವಾಲಿಸ್)	(0.005%) ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾ/100 ಲೀ. ನೀರು	50 ಮಿ.ಲೀ./ 100 ಲೀ. ನೀರು	10 ಲೀ. ನೀರು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ	30
ಮಾವು	ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಯುಮಿನಿಮ್ಯುಲಾ ನೇಕೇಟರ್)	(0.005%) ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾ/100 ಲೀ. ನೀರು	50 ಮಿ.ಲೀ./ 100 ಲೀ. ನೀರು	10 ಲೀ. ನೀರು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ	30
ಧಾನ್ಯಗಳು (ಶಾಮಲೆ/ ಬಟಾಣಿ)	ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಎರಿಸೈಫೆ ಪೊಲಿಗೊನಿ)	(0.005%) ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾ/100 ಲೀ. ನೀರು	50 ಮಿ.ಲೀ./ 100 ಲೀ. ನೀರು	500 ಲೀ./ ಹೆಕ್ಟೇರ್	30

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಟೊಪಾಸ್ 10 EC, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ, ಕೀಟನಾಶಕ, ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಟೊಪಾಸ್ 10 ECಯ ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ LD_{50} ಇಲಿಗಳಿಗಾಗಿ 4099 ಮಿಗ್ರಾ/ಕೆಜಿ, ತೀವ್ರ ತ್ವಚಾ LD_{50} ಇಲಿಗಳಿಗಾಗಿ 3000 ಮಿಗ್ರಾ/ಕೆಜಿ. ಮೊಲಗಳಿಗೆ ತ್ವಚೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉರಿತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಆವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಆಳದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಆನಂತರ ಉಳಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿರಿ. ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೈವೋಲ್ಯುಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ.

ತೇಲುವಿಕೆ:

1. ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯತಃ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕದ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಬೇಕು.
2. ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಿದುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಳಿದಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯಿಯಂದ ಪ್ರದೂಷಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡಿಗೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ಕದಡಿಸಲು ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್‌ಧರಿಸಿರಿ. ಸ್ಪ್ರಾಪೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪೋಷಾಕು, ಮೊಗಕಾವು, ಗಾಗಲ್ಸ್, ಬೂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ತುಂತುರುಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ನೆಲೆಸದಂತೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾಲ್ಕುಲನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿರಿ. ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ ಕೂಡದು. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಬೇಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೊರೆ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಸೆದು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ದೂಷಿತ ಗೊಳಿಸಬೆಡಿರಿ.

ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಕೂಡದು. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಭವ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಧಾರಕಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:

1. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣಾ ಸಲಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಮಷವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೂಷಣವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತೊಲಿಸಬೇಕು.
2. ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸರಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಬಿಡಬೇಕು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಚಾರ: ಮಾನವರಿಗೆ ವಿಷತಗಲಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಮೂಷಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನೀಡಿರಿ. ವಿಷರೀತ ವಿಷ ಸೇವನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಲರಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಿರಿ.

ڈوپاس 10 ای سی

پینکونیزول 10% ای سی

(ایک انتردار پھپھوندکش)

ٹوپاس 10 ای سی ایک انتردار پھپھوندکش اور کھرمٹ کے روگ کے خلاف عمدہ کارکردگی والا ایک اثردار پھپھوندکش ہے۔ یہ فی لیٹر 100 گرام پینکونزول (1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-n-pentyl]- 1H-1,2,4-triazole) پر مشتمل ہوتا ہے۔

استعمال:

ٹوپاس 10 ای سی متعلقہ فصلوں میں مندرجہ ذیل بیماریوں کی روک تھام کے لیے تجویز کیا گیا ہے:

فصل	بیماری کا نام	گرام/ایکڑ	خوراک (ایکڑ) فارمولیشن (ایم ایل)	پانی میں گھول (لیٹر)	آخری اسپرے سے کٹائی تک انتظار کا وقفہ (دنوں میں)
1	2	3	4	5	6
انگور	خشہ پھپھوندی (یونسینولا نیکیٹر)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت (ضرورت کے مطابق)	ضرورت پر منحصر 30
سیب	خشہ پھپھوندی (وینٹوریا انیجلس)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت	30
آم	خشہ پھپھوندی (اوئیڈیم مینجیفیرے)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت	30
دال (کلائی مونگ)	خشہ پھپھوندی (ایرائسفے پولیگونی)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	500 لیٹر پانی فی ہیکٹر	30

ہم آہنگی: ٹوپاس 10 ای سی عام استعمال کے دوسرے پھپھوندکش، کیڑے مار دوا اور کھاد کے ساتھ ملتے جلتے فارمولیشن میں ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہر ایک دائمی مشورہ کے لیکل استعمال کے مطابق چیک کرلیں۔

زہریلاپن: شدید اور ایل ڈی 50 سے کم کے لیے 4099 کلوگرام فی کلوگرام ہوتے ہیں۔ شدید ڈرمل ایل ڈی 50 ریٹ تک 3000 کلوگرام فی کلوگرام ہوتے ہیں۔ یہ جلد اور آنکھ کی آنکھوں میں کم سے کم کھجلاہٹ پیدا کرنے میں معتدل ہے۔

ہدایات برائے استعمال: پروڈکٹ کی مطلوبہ مقدار کو پیمانے کے ذریعے ناپیں اور اسے تھوڑے سے پانی میں ملا دیں۔ پانی کی باقی دوسری مقدار کو ہلاتے کے لیے ہلاتے رہیں اور اس مقدار کو استعمال کرنے کے لیے پیکیج ایمپریشن کے مطابق ہائیو اسپرے کا استعمال کریں۔

اسٹوریج:

۱۔ **پھپھوندکش** پر مشتمل پیکج الگ کمروں میں اسٹور کیا جائے یا کمروں سے دراخلوں میں یا ایسے خاطل میں جو دوسرے سامان رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور سے کھانے کے سامان یا اناج کے پانی والے خاطلہ دراخلوں میں رکھا جائے جس کا انحصار پھپھوندکش کی تعداد اور نیچر پر ہو۔

۲۔ پھپھوندکش رکھنے کے لیے کمرے یا احاطے اچھی طرح بنے ہوں، ہوادار اور روشن اور تمام طرح کی آلودگیوں سے بچنے کا سارا انتظام ہونا چاہیے۔

احتیاط: اسپرے تیار کرنے کے لیے کھانا پکانے کے سامان استعمال نہ کریں۔ اسپرے حل بنانے کے لیے چمچوں کا استعمال کریں۔ جلد میں دنگے اس کے لیے دستانے پہن لیں۔ سانس لینے اور آنکھوں میں لگنے سے بچاؤ کریں۔ جب اسپرے کریں تو کپڑے کا حفاظتی ماسک، چشمے، دستانے پہن لیں اور اسپرے کا چیمبر کو کرتے وقت ناک میں منہ سے نہ پیئیں۔ جب پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہوتو کھائیں پئیں یا ہاتھ نہ کی سرکت نہیں۔ ناقابل استعمال اسپرے حل ضائع کریں۔

اسپرے کا رہا پانی اور دوسرے سامان استعمال کرنے کے بعد روزانہ پانی سے صاف کرلیں۔

ہاتھ صابن اور ڈیٹرجنٹ سے سارے پانی سے دھوئیں اور کام ختم ہونے کے بعد کپڑا بدل لیں۔ آلودہ کپڑے بھی دھولیں۔ نہروں، تالابوں اور آبی راستوں کو اس زہریلے پانی سے بچیں کیونکہ اسپرے مٹیریل کا پانی میں آلودہ ہونا زہریلا ہوتا ہے۔

تریاق: کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

टोपास १० ईसि

पेनकोनाजोल १०% ईसि

(एकटि अन्तर्वाही छत्राकनाशक)

टोपास १० ईसि एकटि अन्तर्वाही छत्राकनाशक या ओंड़ो छातारोग ओ मामड़ि रोगेर विरुद्धे दारुण कार्यकर। एते आछे १०० ग्रा पेनकोनाजोल (१-(२-(२, ४-डाइक्लोरोफिनाइल)-एन- (पेनटाइल)-१ एइच-१, २, ४-ट्रायाजोल) इमालसिफायेबल कनसेनट्रेटे (ईसि) फर्मुलेशनेर प्रति लिटारे।

प्रयोग: टोपास १० ईसि एईसब फसलेर निम्नलिखित रोगेर नियन्त्रणेर जन्य सुपारिशकृत।

फसल	रोगेर साधारण नाम	मात्रा/(हे) ग्रा स उ अथवा %	फर्मुलेशन (मिलि.)	जलेर मिश्रण (लि)	शेष स्प्रे ओ फसल काटार मधे विराम (दिने)
१	२	३	४	५	६
आङ्गुर	ओंड़ो छातारोग (इडोनासिनुला नेकाटर)	०.००५% अथवा ५ ग्रा/१०० लि. जलेर	५० मिलि/ १०० लि	प्रयोजन अनुसारे जलेर मध्ये निर्भरशील	३०
आपेल	मामड़ि रोग (वेनचुरिया इनायेकालिस)	०.००५% अथवा ५ ग्रा/१०० लि. जलेर	५० मिलि/ १०० लि	१० लि जल गाछ प्रति	३०
आम	ओंड़ो छाताबोग (ओर्टियाम मांगिफेरे)	०.००५% अथवा ५ ग्रा/१०० लि. जलेर	५० मिलि/ १०० लि	१० लि जल गाछ प्रति	३०
डाल (कलाई मुग)	ओंड़ो छाताबोग (एरिसिफे पलिगोनि)	०.००५% अथवा ५ ग्रा/१०० लि. जलेर	५० मिलि/ १०० लि	५०० लि हेक्टा	३०

मिश्रणयोगाता: टोपास १० ईसि निर्दिष्ट फसलेर अन्य सव साधारणभावे व्यवहृत छत्राकनाशक, कीटनाशक, आगाछानाशक ओ सारेर सङ्गे मिश्रणयोगाता। ह्यानीयभावे मिश्रणयोगाता परीक्षा करे नेओया सर्वदा सुपारिशकृत।

विषाक्तता: टोपास १० ईसि-एर तीव्र मौखिक एलडि$_{50}$ हल ४०९९ मिग्रा/किग्रा। ईंदुरेर तीव्र त्वकेर एलडि$_{50}$ हल > ३००० मिग्रा/किग्रा। एटि खरगोशेर त्वक ओ चोखे माञ्चारि थेके मृदु प्रदाहकारक।

व्यवहारेर निर्देश: उेपादनटि प्रयोजन मत परिमाणे मेपे निये आर परिमाण जलेर ताला करे मिशिये निन। निर्देशमत बाकि जल ढेले वेश करे नाड़िये मिशिये नेवेन न्याप्‌साक स्प्रेयार दिये हाई भलिउम प्रयोगेर जन्य।

संरक्षण:

१. छत्राकनाशक भरा प्याकेजगुलि अन्य वस्तु, विशेषत खाद्यद्रव्य राखार घर वा वड़ि थेके दूरे आलादा घर वा वाटिते मजुद करते हवे अथवा छत्राकनाशकेर परिमाण ओ चरित्र अनुसारे आलादा आलमारितेे तालाचाबि दिये राखते हवे।
२. छत्राकनाशक मजुद करार घर वा वाड़ि हवे सुनिर्मित, वातासयुक्त, सूआलोकित ओ वातास चलाचलेर उपयुक्त एवं वाष्पद्वारा दूषण एड़ाते यथेष्टपरिसरयुक्त।

सावधानता: स्प्रे मिश्रण तैरि करते रान्नार वासन व्यवहार करवेन ना। स्प्रे मिश्रण न्याचार समय दण्ड व्यवहार करुन। त्वकेर स्पर्श एड़ाते हाते दस्ताना व्यवहार करुन। श्वासेर सङ्गे ग्रहण अथवा चोखेर सङ्गे सस्पर्श एड़िये चलुन। स्प्रे करार समय सुरक्षामूलक पोशाक, मुखोश, गगल्‌स, बूट परवेन एवं स्प्रे'र छिटेर दिके निजेके मेलें धरवेन ना। मुख दिये नजलें फूं देवेन ना। छत्राकनाशकटि नाड़ाचाड़ा अथवा व्यवहार करार समय खाओया, पान करा अथवा धूमपान करा निषेध। अव्यवहृत स्प्रे मिश्रण मजुत करे राखवेन ना।

प्रतिदिन व्यवहारेर पर स्प्रेयार, वालति ओ अन्यान्य पात्र जल दिये धुये नेवेन।

काजेर शेषे गेले साबान ओ प्रचुर जल दिये हात धुये नेवेन एवं पोशाक वदले नेवेन। दूषित पोशाकेर धुये नेवेन। वाति स्प्रे मिश्रण ढेले अथवा स्प्रेयार, दूषित वालति इत्यादि धुये जलधारा, पुकुर, जलपथ इत्यादि दूषित करवेन ना।

मौमाछिर सक्रिय थाकले स्प्रे करवेन ना। सुपारिशकृत मात्राय प्रयोग करले वन्य प्राणीदेर उपर कोनओ विपरीत प्रतिक्रियार आशंका नेई। विषक्रियार कोनओ रकम लक्षण देखा गेले सङ्गे सङ्गे डाक्तार डाकुन।

आधार विनष्टकरण :

१. प्याकेजअथवा वाति वस्तु एवं मेशिन ओ पात्र धोयानि जल एमन सावधाने फेलते हवे याते परिवेशेर ओ जल दूषण एड़ानो याय।
२. पुनर्व्यवहार एड़ाते व्यवहृत प्याकेजगुलि वाईरे फेले राखवेन ना।
३. प्याकेजगुलि भेङे लोकवसति थेके दूरे पुँते फेलते हवे।

विषक्रियार लक्षण ओ चिकित्सा: मानवदेहे विषक्रियार कोनओ घटना जानां नेई। गवेषणागारेर परीक्षाय ईंदुरे विषक्रियार लक्षण छिल अनिर्दिष्ट।

प्राथमिक चिकित्सा: तक ओ चोखेर सङ्गे स्पर्श लागले सङ्गे सङ्गे प्रचुर जलें धुये निन। श्वासेर सङ्गे ग्रहण करे थाकले ताजा हाओया निये याने। गिले फेललें वेशि परिमाणे मेडिकाल ताराकोल प्रचुर जलेर सङ्गे खाईये देवेन। वेशि मात्राय घन छत्राकनाशक पेटे गिये थाकलें अथवा प्रदाह वजाय थाकलें डाक्तारेर परामर्श निन।

प्रतिषेधक: कोनओ निर्दिष्ट प्रतिषेधक जानां नेई। लक्षण अनुयायी चिकित्सा करान।

ڈوپاس 10 ای سی

پینکونیزول 10% ای سی

(ایک انتردار پھپھوندکش)

ٹوپاس 10 ای سی ایک انتردار پھپھوندکش اور کھرمٹ کے روگ کے خلاف عمدہ کارکردگی والا ایک اثردار پھپھوندکش ہے۔ یہ فی لیٹر 100 گرام پینکونزول (1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-n-pentyl]- 1H-1,2,4-triazole) پر مشتمل ہوتا ہے۔

استعمال:

ٹوپاس 10 ای سی متعلقہ فصلوں میں مندرجہ ذیل بیماریوں کی روک تھام کے لیے تجویز کیا گیا ہے:

فصل	بیماری کا نام	گرام/ایکڑ	خوراک (ایکڑ) فارمولیشن (ایم ایل)	پانی میں گھول (لیٹر)	آخری اسپرے سے کٹائی تک انتظار کا وقفہ (دنوں میں)
1	2	3	4	5	6
انگور	خشہ پھپھوندی (یونسینولا نیکیٹر)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت (ضرورت کے مطابق)	ضرورت پر منحصر 30
سیب	خشہ پھپھوندی (وینٹوریا انیجلس)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت	30
آم	خشہ پھپھوندی (اوئیڈیم مینجیفیرے)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	10 لیٹر پانی فی درخت	30
دال (کلائی مونگ)	خشہ پھپھوندی (ایرائسفے پولیگونی)	0.005% یا 5 گرام/100 لیٹر پانی	50 ایم ایل/100 لیٹر پانی	500 لیٹر پانی فی ہیکٹر	30

ہم آہنگی: ٹوپاس 10 ای سی عام استعمال کے دوسرے پھپھوندکش، کیڑے مار دوا اور کھاد کے ساتھ ملتے جلتے فارمولیشن میں ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہر ایک دائمی مشورہ کے لیکل استعمال کے مطابق چیک کرلیں۔

زہریلاپن: شدید اور ایل ڈی 50 سے کم کے لیے 4099 کلوگرام فی کلوگرام ہوتے ہیں۔ شدید ڈرمل ایل ڈی 50 ریٹ تک 3000 کلوگرام فی کلوگرام ہوتے ہیں۔ یہ جلد اور آنکھ کی آنکھوں میں کم سے کم کھجلاہٹ پیدا کرنے میں معتدل ہے۔

ہدایات برائے استعمال: پروڈکٹ کی مطلوبہ مقدار کو پیمانے کے ذریعے ناپیں اور اسے تھوڑے سے پانی میں ملا دیں۔ پانی کی باقی دوسری مقدار کو ہلاتے کے لیے ہلاتے رہیں اور اس مقدار کو استعمال کرنے کے لیے پیکیج ایمپریشن کے مطابق ہائیو اسپرے کا استعمال کریں۔

اسٹوریج:

۱۔ **پھپھوندکش** پر مشتمل پیکج الگ کمروں میں اسٹور کیا جائے یا کمروں سے دراخلوں میں یا ایسے احاطوں میں جو دوسرے سامان رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور سے کھانے کے سامان یا اناج کے پانی والے خاطلہ دراخلوں میں رکھا جائے جس کا انحصار پھپھوندکش کی تعداد اور نیچر پر ہو۔

۲۔ پھپھوندکش رکھنے کے لیے کمرے یا احاطے اچھی طرح بنے ہوں، ہوادار اور روشن اور تمام طرح کی آلودگیوں سے بچنے کا سارا انتظام ہونا چاہیے۔

احتیاط: اسپرے تیار کرنے کے لیے کھانا پکانے کے سامان استعمال نہ کریں۔ اسپرے حل بنانے کے لیے چمچوں کا استعمال کریں۔ جلد میں دنگے اس کے لیے دستانے پہن لیں۔ سانس لینے اور آنکھوں میں لگنے سے بچاؤ کریں۔ جب اسپرے کریں تو کپڑے کا حفاظتی ماسک، چشمے، دستانے پہن لیں اور اسپرے کا چیمبر کو کرتے وقت ناک میں منہ سے نہ پیئیں۔ جب پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہوتو کھائیں پئیں یا ہاتھ نہ کی سرکت نہیں۔ ناقابل استعمال اسپرے حل ضائع کریں۔

اسپرے کا رہا پانی اور دوسرے سامان استعمال کرنے کے بعد روزانہ پانی سے صاف کرلیں۔

ہاتھ صابن اور ڈیٹرجنٹ سے سارے پانی سے دھوئیں اور کام ختم ہونے کے بعد کپڑا بدل لیں۔ آلودہ کپڑے بھی دھولیں۔ نہروں، تالابوں اور آبی راستوں کو اس زہریلے پانی سے بچیں کیونکہ اسپرے مٹیریل کا پانی میں آلودہ ہونا زہریلا ہوتا ہے۔

تریاق: کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

ಟೊಪಾಸ್ 10 EC

ಪೆನ್‌ಕೊನಾಜೋಲ್ 10% EC

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂ